

CRATE

Προϊόν παράλληλου εμπορίου (προϊόν αναφοράς: CARNADINE)
acetamiprid (ασεταμπιπρίντ) 20% • Πυκνό διάλυμα (SL)

Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον κυρίως μυζητικών εντόμων καθώς και μασσητικών εντόμων σε πολλές καλλιέργειες. Το acetamiprid ανήκει στην ομάδα των νεονικοτινοειδών και δρα δεσμεύοντας τους μετασυναπτικούς (νικοτινικούς) υποδοχείς της ακετυλοχολίνης στο κεντρικό νευρικό σύστημα του εντόμου (βλ. ετικέτα).

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Για να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή με εντομοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκάστικο υγρό. Να μη γίνει επανείσοδος για 24 ώρες μετά την εφαρμογή της μεγάλης δόσης σε εσπεριδοειδή. Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός Φυλλώματος. Τρόπος παρασκευής ψεκάστικού υγρού: Ανακινούμε καλά το δοχείο/φιάλη πριν από την χρήση. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκάστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος σιγά σιγά με αναδευτήρα σε λειτουργία. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Καθαρισμός ψεκάστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκάστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύντε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκάστικού, δύο - τρεις (2 - 3) φορές με καθαρό νερό. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκάστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας. Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις (ημέρες): Εσπεριδοειδή (δόση 70 κ.εκ/στρέμμα), Βαμβάκι, Δαμασκησιά, Μπρόκολο, Κουνουπίδι, Λαχανο: 14. Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά: 21. Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Γκρέιπ-φρουτ): (δόση 150 κ.εκ/στρέμμα): 60. Εσπεριδοειδή (Λεμονιά, Μανταρινιά, Λάιμ, Φράπα): (δόση 150 κ.εκ/στρέμμα): 30. Λοιπά σαλατικά (εκτός baby leaf): 10. Πατάτα, Μελιτζάνα (Υ), Ελιά ελαιοποιήσιμη: 7. Αμπέλι (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια): 21. Επιτραπέζια ελιά: 28. Μελιτζάνα (Θ), Τομάτα (Θ), Κερασιά: 3. Τομάτα (Υ): 14. Ελαιοκράμβη: 20. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, καλά κλειστό, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, προστατευμένο από ηλιακό φως, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Η εταιρία **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο
EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015



12

10/2025



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α' Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —

CRATE

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις σκευάσματος - Χρόνος εφαρμογής - Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο - Μεσοδιάστημα εφαρμογών: Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιφ φρούτ, Φράπα, Λάιμ): Για **i)** Φυλλοκνίστη με 35-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.εκ. (max) σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, **ii)** Πράσινη αφίδα, Αφίδα βαμβακιού, Μαύρη αφίδα, **Χρήσεις ήσσονος σημασίας:** Ανατολική μύγα των καρπών**, Μύγα των ροδάκινων** με 25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 35 κ.εκ. (max) σε 60-140 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, **iii)** Κόκκινη ψώρα, Παρλατόρια, Ψευδόκοκκο με 50-70 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 150 κ.εκ. (max) σε 100-200 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 2 ψεкаσμοί ανά 30 ημέρες με την εμφάνιση της προσβολής. **Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά): α) Για i)** Φυλλοκνίστη με 25-35* κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 κ.εκ. (max) σε 70-100* λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, **ii)** Πράσινη αφίδα με 15-25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 κ.εκ. (max) σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, **iii)** Ροδίνη αφίδα, Αφίδα αχλαδιού με 25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 κ.εκ. (max) σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, **iv)** Οηλοκάμψη με 35-50* κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 κ.εκ. (max) σε 50-70* λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 2 ψεкаσμοί ανά 60 ημέρες με την εμφάνιση της προσβολής. **β)** Για Καρπόκαψα με 35-50* κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 κ.εκ. (max) σε 50-70* λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 2 ψεкаσμοί φυλλώματος ανά 60 ημέρες μετά την έναρξη των εκκολάψεων σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. **Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά: α) Για i)** Πράσινη αφίδα, Φυλλορύκτες, Τζιτζικάκια με 25-35* κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 20 κ.εκ. (max) σε 55-80* λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, **ii)** Αφίδες με 25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 20 κ.εκ. (max) σε 80 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, **iii)** Θρίπες με 35-50* κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 20 κ.εκ. (max) σε 40-55* λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 ψεкаσμός με την εμφάνιση της προσβολής. **β)** Για Καρπόκαψα, Ανάρσια με 35-50* κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 20 κ.εκ. (max) σε 40-55* λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 ψεкаσμός φυλλώματος μετά την έναρξη των εκκολάψεων σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. **Δαμασκηνιά: i)** Για Αφίδες, Φυλλορύκτες με 25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 κ.εκ. (max) σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 2 ψεкаσμοί ανά 20 ημέρες με την εμφάνιση της προσβολής. **ii)** Για Καρπόκαψα με 25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 κ.εκ. (max) σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 2 ψεкаσμοί φυλλώματος ανά 20 ημέρες μετά την έναρξη των εκκολάψεων σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. **Κερασιά: Για i)** Ραγολέτις, **Χρήσεις ήσσονος σημασίας:** Ανατολική μύγα των καρπών**, Μύγα των ροδάκινων** με 25-35 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 35 κ.εκ. (max) σε 100-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, **ii)** Μαύρη αφίδα με 15-25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 κ.εκ. (max) σε 100-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 2 ψεкаσμοί ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση της προσβολής. **Ελιά (επιτραπέζια): i)** Για Πυρηνотρήτη με 45 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 45 κ.εκ. (max) σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού ανά στρέμμα. 1 ψεкаσμός καλύψεως εναντίον της ανθόβιας και καρπόβιας γενιάς σύμφωνα με τις συστάσεις των τοπικών κέντρων γεωργικών προειδοποιήσεων. **ii)** Για Δάκο της ελιάς, **Χρήσεις ήσσονος σημασίας:** Ανατολική μύγα των καρπών**, Μύγα των ροδάκινων** με 25-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. (max) σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού ανά στρέμμα. 2 ψεкаσμοί καλύψεως ανά 14 ημέρες σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες. **Ελιά (επιτραπέζια): i)** Για Πυρηνотρήτη με 45 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 45 κ.εκ. (max) σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού ανά στρέμμα. 1 ψεкаσμός καλύψεως εναντίον της ανθόβιας και καρπόβιας γενιάς σύμφωνα με τις συστάσεις των τοπικών κέντρων γεωργικών προειδοποιήσεων. **ii)** Για Δάκο της ελιάς, **Χρήσεις**

ήσσονος σημασίας: Ανατολική μύγα των καρπών**, Μύγα των ροδάκινων** με 45 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 45 κ.εκ. (max) σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού ανά στρέμμα. 1 ψεкаσμός καλύψεως σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες. **Αμπέλι (οινοποιήσιμο και επιτραπέζιο): i)** Για Τζιτζικάκια με 25-35* κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 κ.εκ. (max) σε 70-100* λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 ψεкаσμός με την εμφάνιση της προσβολής. **ii)** Ευδεμίδα με 35-45* κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 κ.εκ. (max) σε 55-70* λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 ψεкаσμός κάλυψης σύμφωνα με τις Γεωργικές Προειδοποιήσεις. **Βαμβάκι:** Για Αφίδες, Καφέ Βρωμούσα (Χρήση ήσσονος σημασίας)** με 20 κ.εκ. (max) σε 50-80 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 2 ψεкаσμοί ανά 20 ημέρες με την εμφάνιση της προσβολής. **Λοιπά σαλατικά (εκτός baby leaf), Κάρδαμο, Γαιοκάρδαμο, Ρόκα, Κόκκινο σινάπι:** Για **i)** Αφίδες με 25-35 κ.εκ. (max) σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, **ii)** Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae με 20-25 κ.εκ. (max) σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 ψεкаσμός με την εμφάνιση της προσβολής. **Πατάτα:** Για **i)** Δορυφόρο με 10-15 κ.εκ. (max) σε 40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, **ii)** Αφίδες με 20 κ.εκ. (max) σε 30-60 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 2 ψεкаσμοί ανά 7 ημέρες με την εμφάνιση της προσβολής. **Τομάτα (Υ):** Για **i)** Πράσινη αφίδα με 20-25* κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 20-25 κ.εκ. (max) σε 50-100* λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, **ii)** Αλευρώδεις με 35-50* κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30 κ.εκ. (max) σε 60-85* λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 ψεкаσμός με την εμφάνιση της προσβολής. **Τομάτα (Θ):** Για **i)** Πράσινη αφίδα με 20-25* κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 20-25 κ.εκ. (max) σε 50-100* λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, **ii)** Αλευρώδεις με 35-50* κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 κ.εκ. (max) σε 50-70* λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 ψεкаσμός με την εμφάνιση της προσβολής. **Μελιτζάνα (Υ+Θ):** Για **i)** Πράσινη αφίδα με 20-25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 20-25 κ.εκ. (max) σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, **ii)** Αλευρώδεις, **Χρήσεις ήσσονος σημασίας:** Ανατολική μύγα των καρπών**, Μύγα των ροδάκινων** με 35-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 35-50 κ.εκ. (max) σε 100-170 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 2 ψεкаσμοί ανά 20 ημέρες με την εμφάνιση της προσβολής. **Κουνουπιδί (Υ), Μπρόκολο (Υ), Λάχανο (Υ):** Για Πλουτέλλα με 25-35 κ.εκ. (max) σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 ψεкаσμός με την εμφάνιση της προσβολής. **Ελαιοκράμβη:** Για **i)** Αφίδες με 25 κ.εκ. (max) σε 10-40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, **ii)** Σκαθάρι της γύρης με 30 κ.εκ. (max) σε 10-40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 2 ψεкаσμοί ανά 7 ημέρες με την εμφάνιση της προσβολής. **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1.** Χρησιμοποιήστε την μεγάλη δόση σε περίπτωση μεγάλης προσβολής. **2.** Μην ψεкаζετε κατά την άνθηση των καλλιεργειών με εντομόφιλη επικονίαση. **3.** Στην περίπτωση εφαρμογής δόσεων σε κ.εκ./100 λίτ.ψεкаστικού υγρού, η δόση να συνδυάζεται κατάλληλα με τον όγκο νερού ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα. *Συνδυάζεται η μικρή δόση με τον μεγάλο όγκο νερού και αντιστρόφως ώστε να μην ξεπεραστεί η μέγιστη δόση στο στρέμμα. **«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στην καφέ βρωμούσα του βαμβακιού και κατά της ανατολικής μύγας των καρπών και της μύγας των ροδάκινων στις καλλιέργειες εσπεριδοειδών, κερασιάς, ελιάς, μελιτζάνας. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος».

13

10/2025



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α' Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —

