ET-021a-GR-Q14-R00

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα και χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σπαρτά του σιταροκάλαμου με τις ψεκαστικές διάλυσεις με ο ψεκαστήρας βλαστού ή κοχλιάς κατάλληλο προς αποφυγή φυτοτοξικότητας ή συσσώρευσης υπολειμμάτων στους καρπούς. Για την αποβάλλεται στον κοπιό εφαρμόζεται με 30-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα με ψεκαστικό κολλώνας της φυτείας. Χρησιμοποιείστε μπαν τότου σκούπα και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI). **Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:** Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση περοέθεσε ανάδευσης, την συνεπώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό ανάδευσης συνέχεις. Μη χρησιμοποιείτε ακάθαρτο ή σκληρό νερό γιατί η διάλυση του φαρμάκου.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τους ζ3 φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μόχρι να εξαφανιστεί πλήρως όλο το ίχνη του προϊόντος. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Οι φάλες βρίσκονται υπό πίεση ή μόνιμα γεμάτο βτίλιμμα (το νερό του βτίλιμμα το χθόνιμα στο ψεκαστικό υφρό και στη συνέχεια αφού καταστραφεί πρεγιμένως με τρόπομο για τη διαφορίκη της μη περαιτέρω χρήσης, ακατάλληλα σε σημεία συλλογής για ακαλαλλαγή ή ανακύκλωσης.

Συνδυαστικότητα: -

Πεδίο Εφαρμογής/Ενδεχόμενος σκοπός/στόχος:

Εστιμβολική (Περικοκαλία, Μαπαρμπα, Αμμινιά, Γιρέτη φρουτ, Κερεβί, Ακρόξυλο (Αμμιβολιά), Μηλοειδή (Μηλιά, Αμμιδιά), Πυρηνόκαρπα (Βερικοκιά, Ροδακινιά, Νεκτορινιά, Κερασιά), Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμη), Ελιά (επιτραπέζια και ελαιοποιήσιμη): Γιο Ετήσια ζιζάνια (1 εκρυπτωθή και πλατιφυλλά) με 150-200 κυκ. σκυτήρ. Κατεβάνωνας ψεκαστός μπορεμπρεπιστά των ζιζανίων, επί των γραμμών φύτευσης (ανάμεσα στο δενδρό πρόμνα) κολιστικτικα (λιμ) το 33% της συνολικής επιφάνειας του αγρού. Γιο Μαλάχη (Malva sp.), Τσουκνιδα (Urtica sp.), Πολυκάρπι (Polygonum sp.), Αγριάδιλα (Portulaca oleracea) με 400-600 κυκ. σκυτήρ. Εφαρμογή στον τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης. Γιο πολυετή ζιζάνια (1 ζωής ανωμένα) με 500-800 κυκ. σκυτήρ. (ανάλογα με το εύδος του πολυετούς ζιζανίου ως ανωμένα). Στον τα ζιζάνια βρίσκονται στην ανθίση κατά την ανθίση ή λίγο μετά από αυτή.

Αναλλάγμενες ασύστοιχες (βιωτμρικούς περιοχές): περιοχές αγροτικολογικά τιλιπίες, πλάι σε δρόμους και εθνικές οδούς, σε χώρους με φυτοβιοτικά πάνω, σε αστικές και αγροτικές περιοχές: Γιο Ετήσια ζιζάνια (1 εκρυπτωθή και πλατιφυλλά) με 150-200 κυκ. σκυτήρ. Γιο Μαλάχη (Malva sp.), Τσουκνιδα (Urtica sp.), Πολυκάρπι (Polygonum sp.), Αγριάδιλα (Portulaca oleracea) με 400-600 κυκ. σκυτήρ. Εφαρμογή στον τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης. Γιο πολυετή ζιζάνια (1 ζως ανωμένα) με 500-800 κυκ. σκυτήρ. (ανάλογα με το εύδος του πολυετούς ζιζανίου ως ανωμένα). Στον τα ζιζάνια βρίσκονται στην ανθίση κατά την ανθίση ή λίγο μετά από αυτή.

Κατά μήκος αρδευτικών & στραγγιστικών καναλιών: Γιο εξάρφρτη ζιζάνια με 800 κυκ. σκυτήρ. Εφαρμογή κοντά ή κατά την ανθίση των ζιζανίων. Σε όλες τις προαναφερόμενες καλλιέργειες ο όγκος ψεκ. υφρού είναι 20-40 λίτρα/στρ.

Κατανάλ: Γιο εφάρμφρη (Ontbanche πιπτοιαί με ζ) 40 κυκ. σκυτήρ. ζ) 60 κυκ. σκυτήρ. Όγκος ψεκ. υφρού: 30-40 λίτρα/στρ. Ψεκαζού καλλιέργε ζ) 40 μέρες μετά τη μπαφφιέστη. ζ) 60 μέρες μετά τη μπαφφιέστη.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Εστιμβολική (Περικοκαλία, Μαπαρμπα, Αμμινιά, Γιρέτη φρουτ, Κερεβί, Ακρόξυλο (Αμμιβολιά), Μηλοειδή (Μηλιά, Αμμιδιά), Πυρηνόκαρπα (Βερικοκιά, Ροδακινιά, Νεκτορινιά, Κερασιά), Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμη), Ελιά (επιτραπέζια και ελαιοποιήσιμη): 1-3(2ε)*, Βαμβάκι, Αμμιβ.μπιά η συμφωνία της κάλλιφρας ή πριν την καταγγιστα του εδάφους για σπαρά. Κατά μήκος αρδευτικών & στραγγιστικών καναλιών: 1(*). Κάπνιζ: 2(**). Ακαλλάγμενες ασύστοιχες (βιωτμρικούς περιοχές: αγροτικολογικά τιλιπίες, πλάι σε δρόμους και εθνικές οδούς, σε χώρους με φυτοβιοτικά πάνω, σε αστικές και αγροτικές περιοχές): 1-2(1 (**)

*Μέγιστη δόση ανά εφαρμογή 278 γρ. δοσιόμμρο. ** Μέγιστη δοσιόμμφρφη 216 γρ δοσιόμμρο

Γιο τις καλλιέργειες Εστιμβολική (Αχρόξυλο, Μηλοειδή), Πυρηνόκαρπα, Αμπέλι, Ελιά η μέγιστη δόση στο σύνολο των εφαρμογών (12 μήνες) 420 γρ. δοσιόμμρο. Γιο όλες τις υπόλοιπες χρήσεις η μέγιστη δόση στο σύνολο των εφαρμογών (12 μήνες) 432 γρ. δοσιόμμρο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1) Στις δενδρώδες καλλιέργειες και στη φιπτάνα ο ψεκαστής των ζιζανίων πρέπει ο φύτο ενός κατευθύνεται στη γραμμή φύτευσης ή κάτω από τη κόμη των δένδρων κολιστικτικα το 1/3 της συνολικής επιφάνειας του αγρού που πρόκειται να ψεκαστεί. Τονίζεται, ότι η δοσολογία εφαρμογής σκεφτότα από στρέμμα ψεκαστέας επιφάνειας. Επομένως η πραγματική δοσολογία εφαρμογής ανά στρέμμα σπαρμένο ή αμπελώνα θα είναι κατά πρόσεγγιση μόνο το 33%. β) Να μην εφαρμόζεται μπαξίν των γραμμών φύτευσης. γ) Νά αποφεύγεται η επαφή των σπαρτών του ψεκαστικού διάλυσε με καρπούς, φύλλωμα τρυφερής βλαστού, παρακείμενες και μη καλλιέργειες πλήρες ανάδειας. δ) Νά μη γίνεται σε ημερομηνίες σπαρμένες ή φυτεμένες από το 3ο έτος από την φύτευση τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών. 2) Γιο τα πλατιφυλλα ζιζάνια Μάλκα sp. (μολόχα), Urtica sp. (τσουκνιδα), Πλάχρισμα sp. (πολυκάρπι, λαπάτσα) Portulaca oleracea (γιορδάνι) η δόση κυμαίνεται από 400-600 κυκ. ύφτμμρο ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής τους. 3) Γιο την καταπολέμηση των ετήσιων ζιζάνιων απαιτούνται συνήθως μία με δύο εφαρμογές (χαμηλοκαλή) ή/και (κολοκαλή-ψιλοκαμμένο) ανάλογα με την ετησή εμφάνισης των ζιζάνιων και την καλλιέργεια στον τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης.

4) Γιο την καταπολέμηση πολυετών ζιζάνιων απαιτείται συνήθως μία εφαρμογή στον τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην ανθίση κατά την ανθίση ή λίγο μετά από αυτή. 5) Επιβάλλεται η χρήση προστατευτικών καλμμάνων (καλυπτρών) γύρω από τα μπέ για την αποφυγή φυτοτοξικότητας στις καλλιέργειες. 6) Γιο την ομοιόμορφη εφαρμογή να γίνεται στον ήρεμο (χωρίς 15-30 κ. 7) Γιο τη χρήση η εφαρμογή να γίνεται μετά το βρεμμένο της καρυφής. 8) Να μη γίνεται ψεκασμός σαν σκεμπάτα βρεχή σε 6 ώρες

202312

SATELITE 36SL

Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησιών και πολυετών (αγρωστώδων, πλατυφύλλων ζιζάνιων) και υδροχαρών ζιζάνιων, ξυλωδών φυτών, καθώς και για την καταπολέμηση της οροβάγχης του καπνού.
Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοέξεων.

Αριθμ. Έγκρ. κυκλοφορίας: 7954/01.03.2011

GLYPHOSATE (ΓΛΙΦΟΣΕΪΤ) 36% - Υγρό διάλυμα (SL)

Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:
Δραστικές ουσίες: Glyphosate οξύ 36 %
(υπό μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης 48,6% β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: 57,92 % β/β

Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς
με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Κάτοχος της άδειας:
Albaugh TKI doo Gripski trg 21, SI-2327 Rače, Σλοβενία

Περιεχόμενο: **500 K.EK.**

FARMA-CHEM SA

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
FARMA-CHEM SA
ΒΙΤΕ, ΣΝΔΟΥ - Γ ΖΩΝΗ
Τ.Θ.1025 - 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 569.630 (ως 3 - FAX: 2310 797.047
farmachem@otenet.gr - registration@farmachem.gr -
www.farmachem.gr

ISO 9001

5 206284 300095

Παρασκευαστής σκευάσματος:
Industrias Afrasa S.A. Pol. Ind. Fuente del Jarro c/Ciudad de Sevilla 53 46988 Paterna, Valencia, Ισπανία

Δηλώσεις προφύλαξης:
Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Απαγορεύεται να αναπνέετε σκόνη / ανάβλυσμα / αέρα / ατμογενάδα / ατμός / ανοιχόμενα. Να μην βρέξει σε ατμοί με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Φορέστε κάλσιμμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος. Σε περίπτωση επαναλαβόν στην καλλιέργεια θέι πρέπει να φορέτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο. Διάθεση του περιεχομένου/περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. ΜΗ ΡΥΠΑΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφεύγεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λάσπτωμες επιφάνειες και τους δρόμους. Γιο να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μετά τον ψεκασμό ζώνη ανάσχεσης / αμάχαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. Γιο να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε από μη γειρμένη γη: α) μία αμάχαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή 5 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσιο μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού κατά 50% (σπαμμένες και αμπελώνες). β) μία αμάχαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή 1 μέτρου σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού κατά 75% (πτήσεις καλλιέργειες ακαλλιέργειες ανάσας κλπ).

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ένδεικης ή αδιαθεσίας:** Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα μπιπαφέμα με το ψεκαστικό υφρό ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για ορισμένα λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Χορηγήστε επαναλήψεις ενεργό ανθρακο διαλμμένο σε μεγάλες ποσότεις νερό. Μη χορηγήσετε τίποτα στο πόλοτο μέν δεν μ' ε ανάθέτας του. Μην προκαλέστε εμέτο. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον πεσόνα από το χώρο της βάπεσης, διατηρώντε τον ζεστό και ήρεμο χώρο. Αναμένετε τρόμπτιπτα σε γιατρό. **Ανιδοτα:** Δεν υπάρχει ειδικό ανίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Η χρήση σπρεπτής και οξυγόνο δεν ενδείκνυται. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:** 210-7793777

9) Να μη χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που προορίζονται για σπαρτοφαγικά. 10) Μην χρεώζετε ανα φυσάω. 11) Να μην χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που παρέμεν υπόρρο βλαύρο τρόπον πριν τη συκιαφόρη τους. 12) Γιο τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η ψεκασμός τους μόνο από τον ο δένδρο. 13) Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή στις περιμένε στο σταύρος ελιές. 14) Η εφαρμογή να γίνεται όταν δεν υπάρχει νερό στα σταμνιστικά κανάλια.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτολόγες ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποσυρθεί: Σε αρόμενα και σπαρμένα κανάλια πρέπει να γίνεται κατεβάνωνας ψεκαστός των ζιζανίων στα πρανή και με τρόπο ώστε να σταμνίσει του ψεκαστικού διαλύμενε να μην πάει στο νερό. Το σκεύασμα περέχει τη δραστική ουσία glyphosate. Ζιζανιόσπορα που ανέτα στην ομάδα 9 κατά HRAC. Υπάρχει μερικής κινδύνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας για τα είδη Lolium spp. και Conyza spp. Γιο τον αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας: Να εφαρμόζονται αναλλακτικές μέθοδοι καλλιέργειας (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικό μέρο κ.λπ.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων στην δραστική ουσία glyphosate.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- **σπαρτής φυτείας:** μη τροποποιημένες καλλιέργειες: **-**
- **σπαρτής ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:** Σε αρόμε μετά την συκιαφόρη και πριν την καταγγιστα του εδάφους για σπαρτά να μεσολάβεί διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ημερών για το ετήσιο ζιζάνι και δεκαπέντε ημέρες (14) ημέρες για τα πολυετή ζιζάνια πριν την καταγγιστα του εδάφους.
- **της πρόσβασης** που ανθρώπων ή των ζώων **στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υφρό στη φυλλικό επιφάνεια. Να μην επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζάνιων ακόμη και στην ξυλή ζιμπέλιαν.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ανασβέστης ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στον εφαρμόζεται σύμφωνα με τα ανεκφαρμόμενα στην ετικέτα του.

Τελευταία επεξάβαση πριν τη συκιαφόρη ή πριν τη διάθεση στην αγορά: Δεν **πρόκειται** για μεσολαλλάκτης χρήσης: Εστιμβολική (Περικοκαλία, Μαπαρμπα, Αμμινιά, Γιρέτη φρουτ, Κερεβί, Ακρόξυλο (Αμμιβολιά), Μηλοειδή (Μηλιά, Αμμιδιά), Πυρηνόκαρπα (Βερικοκιά, Ροδακινιά, Νεκτορινιά, Κερασιά), Ελιά (επιτραπέζια ποικιλία), Βαμβάκι, Κάπνιζ, 7 ημέρες, Ελιά (ελαιοποιήσιμες ποικιλίες) 28 ημέρες, Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμη ποικιλία) 14 ημέρες, Αφού μετά τη συκιαφόρη της καλλιέργειας ή πριν την καταγγιστα του εδάφους για σπαρτά. Αναλλάγμενες ασύστοιχες. Κατά μήκος αρδευτικών & στραγγιστικών καναλιών: -

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονικό σταθερότητα του σκευάσματος: Αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία σε χώρο δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παρμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΗΜ. ΠΑΡΑΓ./ΑΡ. ΠΑΡΤ./ΗΜ. ΑΗΣ.: βλέπε επί της συσκευασίας