

UFI: 7AA0-P07H-X00R-1SSR

TRIFOX™

ΚΛΠ 1 (Γ) (ΙΙ) (Β):

ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ

Επιτρέπεται στην βιολογική γεωργία σύμφωνα με τον ΕΕ 2018/848

Δηλούμενη κατά μάζα περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά:

Ολικός Χαλκός (Cu): 12% B/B, ως οξυχλωριούχος χαλκός, **Ολικός Ψευδάργυρος (Zn):** 20% B/B, ως οξείδιο ψευδαργύρου.

Συστατικά: Ζεόλιθος*, Οξείδιο ψευδαργύρου CAS αριθ. 1314-13-2*, Οξυχλωριούχος χαλκός CAS αριθ. 1332-65-6*, Ανθρακικό ασβέστιο CAS αριθ. 1317-65-3*. *ΚΣΥ 1: Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών.

Μορφή σκευάσματος: Βρέξιμη σκόνη.

Γενικές πληροφορίες: Το TRIFOX είναι ένα λίπασμα με βάση τον χαλκό και τον ψευδάργυρο που αποτελείται από εξαιρετικά υπομικρονικά σωματίδια οξυχλωριούχου χαλκού και οξειδίου ψευδαργύρου. Το TRIFOX αυξάνει την διείσδυση, την προσκόλληση και την ισοκατανομή των σωματιδίων στην επιφάνεια του φύλλου, παρέχοντας χαλκό και ψευδάργυρο για τη θρέψη των καλλιεργειών. Βοηθάει στην αντιμετώπιση του στρες που προκαλείται από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες.

Πρόσθετες πληροφορίες: Μπορεί να χρησιμοποιείται στη βιολογική παραγωγή σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1165, όπως ισχύουν, υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς των εν λόγω κανονισμών.

Η συμβατότητα του TRIFOX με άλλα προϊόντα πρέπει να επιβεβαιώνεται πριν από την ανάμιξη. Πραγματοποιήστε προκαταρκτική δοκιμή συμβατότητας σε μικρή ποσότητα με τα άλλα προϊόντα.

Να μην χρησιμοποιείται σε ψεκαστικά διαλύματα με pH μικρότερο από 6. Συνιστάται η προσθήκη διαβρεκτικού παράγοντα, όπως το INEX-A.

Οδηγίες και δόσεις εφαρμογής: **Σπηρό:** Εφαρμόστε 10-50γρ./στρέμμα από το στάδιο των πέντε πλήρως εκπτυγμένων φύλλων (BBCH 15) έως το στάδιο του δεύτερου κόμβου (BBCH 32). **Ελαιοκράμβη:** Εφαρμόστε 10-50γρ./στρέμμα στο στάδιο των 4-8 φύλλων. **Όσπρια:** Εφαρμόστε 10-50γρ./στρέμμα όταν η καλλιέργεια φτάσει τα 10-15 εκ. σε ύψος. **Εσπεριδοειδή:** Εφαρμόστε 100-200γρ./στρέμμα την άνοιξη, καλύπτοντας νέους βλαστούς. **Λαχανικά:** Εφαρμόστε 10-50γρ./στρέμμα ανάλογα με τα δεδομένα προηγούμενων εφαρμογών, τον βαθμό ανεπάρκειας και την ανοχή της καλλιέργειας.

Κρεμμύδι: Εφαρμόστε 10-50γρ./στρέμμα σε BBCH 13 (3-4 φύλλα), BBCH 17 (7-8 φύλλα) και BBCH 43 (βολβός διαμέτρου 3-5 εκ.). **Οπωροφόρα δέντρα:** Εφαρμόστε 50-100γρ./στρέμμα στη διόγκωση των οφθαλμών (BBCH 00) και μετά τη συγκομιδή. **Μούρα** (φράουλα, βατόμουρο και σμέουρο): Εφαρμόστε 10-50γρ./στρέμμα.

Τυπική δόση: από 50 έως 200 γρ./λίτρο ανάλογα με τη βλάστηση και την φυλλική επιφάνεια.

Τρόπος Εφαρμογής: Γεμίστε το δοχείο κατά τα 3/4 με νερό και προσθέστε τη σωστή δόση υπό ανάδευση. Διατηρήστε την ανάδευση κατά την εφαρμογή. Χρησιμοποιήστε 20-100 λίτρα νερού/στρέμμα, ανάλογα με τον εξοπλισμό του ψεκασμού. Συνιστώνται πολλαπλές εφαρμογές σε χαμηλή δόση.

Τηρείτε τις αναγραφόμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής. Για προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες συμβουλευτείτε τον αρμόδιο γεωπόνο, χωρίς υπέρβαση των μέγιστων αναγραφόμενων δόσεων. Συνιστούμε στους αγρότες να ζητούν συμβουλές από τον σύμβουλό τους, ώστε να μπορούν να προσαρμόσουν τις αστάσεις στην ιδιαίτερη κατάστασή τους και να αποφύγουν την υπερβολική χρήση λιπασμάτων. Να χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Να μην γίνεται υπέρβαση των δόσεων εφαρμογής.

Επικοινωνήστε με την εταιρεία Biogenus LTD για πιο συγκεκριμένες συστάσεις: tech.dp@biogenus.eu.

Συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης: Η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 3 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής του (βλ. επί του περιέκτη). Διατηρείτε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία, καλά κλεισμένο, σε ξηρό και δροσερό μέρος.



ΠΡΟΣΟΧΗ



Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον:

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό. Περιέχει: Οξυχλωριούχο χαλκό. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, επικοινωνήστε με το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ - ΕΛΛΑΔΑ: 210 7793777, ΚΥΠΡΟΣ: 1401 Κατάποση: Πρόκληση εμέτου, αλλά μόνο εάν το θύμα έχει πλήρη συνείδηση. Σε περίπτωση κατάποσης σε μεγάλη ποσότητα ή αδιαθεσία, συμβουλευτείτε γιατρό.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.



Διανέμεται από την **Biogenus Ltd**
Μενελάου Παρλαμά 106, ΤΚ 71 410 Ηράκλειο.
Τ: +30 2810245546, Ε: info@biogenus.eu
W: www.biogenus.eu

CE Καθαρό βάρος: 1kg