

L1121288 GREC/06C PPE4211173



Affirm[®] Opti
9,5 WG

syngenta[®]

GROUP 6 INSECTICIDE

UFI: AUD5-U02K-N00A-8N2R

Emamectin benzoate (χημική ομάδα Αβερμεκτίνες)

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Emamectin benzoate: 0.95 % β/β

Βοηθητικές ουσίες: 99% β/β

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά

(ΑΑΔΑ): 14630/06.12.2017

**Μη διασυστηματικό εντομοκτόνο
για την αντιμετώπιση λεπιδοπτέρων
εντόμων που προσβάλλουν μηλοειδή,
πυρηνόκαρπα, ακρόδρυα και
την ακτινιδιά.**

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ

Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49

Τηλ.: 210 6666612-13 www.syngenta.gr

ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.Π.Ε. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

ΠΡΟΣΟΧΗ



- Μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε όργανα (νευρικό σύστημα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

1 kg e

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON
are Trademarks of a Syngenta Group Company

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Μην αναπνέετε σκόνη. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. • Φοράτε γάντια, οθλώση προστατευτική ενδυμασία και μάσκα κατά τη διάρκεια της ανάμιξης/φόρτωσης και κατά την εφαρμογή. • Η εφαρμογή να γίνεται με τρακτέρ με καμπίνα κλειστού τύπου. • Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακριμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι. • Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Γενικές οδηγίες: Να έχετε διαθέσιμη την ετικέτα ή το φύλλο οδηγιών του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια σε γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το παθόντα στο καθαρό αέρα. Σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή διακοπής της, αρχίστε τεχνητή αναπνοή. Φέρετε τον παθόντα σε θέση ανάπαυσης και διατηρείστε τον ζεστό. Ειδοποιείτε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάψτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό. Αν ο ερεθισμός του δέρματος επιμένει, συμβουλευτείτε ένα γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΤΕ ΕΜΕΤΟ.

Χορηγήστε επανειλημμένα ιατρικό άνηρακα με μεγάλης ποσότητας νερού. Μην χορηγήσετε οτιδήποτε εάν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ
Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.
Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθοστρώτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:

- **40 μέτρων ή 25 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50 %** ή **20 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75 %** ή **15 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **90 %** για την καλλιέργεια των πυρηνοκάρπων.
- **35 μέτρων ή 25 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50 %** ή **15 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75 %** ή **10 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **90 %** για την καλλιέργεια των μηλοειδών.
- **14 μέτρων ή 10 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50 %** ή **5 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75 %** ή χρησιμοποιείστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **90 %** για την καλλιέργεια των ακρόδρυων.
- **15 μέτρων ή 10 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50 %** ή **5 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75 %** για την καλλιέργεια της ακτινιδιάς.

Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας:

- **5 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **90 %** ή **10 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75 %** για την καλλιέργεια των μηλοειδών.
- **5 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **90 %** για την καλλιέργεια των πυρηνοκάρπων.
- **10 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50 %** ή **5 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75 %** ή χρησιμοποιείστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **90 %** για την καλλιέργεια των ακρόδρυων.
- **10 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50 %** ή **5 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75 %** για την καλλιέργεια της ακτινιδιάς.

Επικίνδυνο για τις μέλισσες: Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης να μην εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. Μην χρησιμοποιείται το προϊόν όταν οι μέλισσες είναι παρούσες. Καταποθεμίστε τα ζιζάνια πριν την εφαρμογή του σκευάσματος.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Μη διασυστηματικό εντομοκτόνο για την αντιμετώπιση θηπιδοπτέρων εντόμων που προσβάλλουν μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ακρόδρυα και την ακτινιδιά. Παρουσιάζει διεπασματική κίνηση. Δρά κυρίως με κατάποση. Προσδένεται στους υποδοχείς του γ- αμινοβουτυρικού οξέος (GABA) και ενεργοποιεί το κανάλι ιόντων χλωρίου. Η συνεχής εισροή ιόντων χλωρίου στο μυϊκό ιστό οδηγεί στην παράλυση και τελικά το θάνατο των εντόμων.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. Το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να αναδευτεί καλά πριν αρχίσει ο ψεκασμός.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (καθιλιέργειες, στόχοι, δόσεις σκευάσματος, τρόπος & χρόνος εφαρμογής, μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα):

Μηλοειδή: Μηλιά, Αχλαδιά, Μουσαμουλιά, Κυδωνιά: Για Καρπόκαψα (*Cydia pomonella*, *Grapholita molesta*, *Cydia* spp.), Φυλλοδότες (*Adoxophyes* sp., *Pandemis* sp., *Argyrotaenia lujungiana*, *Archips* sp., *Spilonota* sp.), Φυλλορύκτες (*Leucoptera scitella*, *Lithocolletis blancardella*) και για χρήσεις ήσσονος σημασίας: Καφέ Βρωμούσα (*Halyomorpha halys*)*, Σποντόπερα* (*Spodoptera frugiperda*) και Δροσόφιλα (*Drosophila suzukii*)* 200 γρ.σκ./στρ.(max) ή 150 γρ.σκ./100 λίτ.ψεκ.υγρ. Όγκ.ψεκ.υγρ.: 50-130 λίτ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Για τη καρπόκαψα έναρξη των ψεκασμών με την εκκόλαψη των ωών ή στο μέγιστο των πτήσεων χρησιμοποιώντας τις παγίδες παρακολούθησης. Για τους φυλλοδότες: για τις διαχειμαζουσες προνύμφες ψεκάστε με την επανέναρξη της τροφικής δραστηριότητας μετά την άνθιση και για τις θερινές γενεές ξεκινήστε τους ψεκασμούς στην εκκόλαψη των ωών ή στο μέγιστο των πτήσεων χρησιμοποιώντας τις παγίδες παρακολούθησης. Για τους φυλλορύκτες ξεκινήστε τους ψεκασμούς με την εμφάνιση των πρώτων στερών. Από την έναρξη της ανάπτυξης του καρπού, μετά την άνθιση, έως την ωρίμανση των καρπών για κατανάλωση (BBCH 71-89). Μέχρι 3 εφαρμογές με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα.

Ροδακινιά: Για Ανάραια (*Anarsia lineatella*), Καρπόκαψα (*Grapholita molesta*, *Cydia* sp.) και για χρήσεις ήσσονος σημασίας: Καφέ Βρωμούσα (*Halyomorpha halys*)*, Σποντόπερα* (*Spodoptera frugiperda*) και Δροσόφιλα (*Drosophila suzukii*)* 200-225 γρ.σκ./στρ.(max) ή 150 γρ.σκ./100 λίτ.ψεκ.υγρ. Όγκ.ψεκ.υγρ.: 50-150 λίτ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Έναρξη των ψεκασμών στην εκκόλαψη των ωών ή στο μέγιστο των πτήσεων χρησιμοποιώντας τις παγίδες παρακολούθησης. Από την έναρξη της ανάπτυξης του καρπού, μετά την άνθιση, έως την ωρίμανση των καρπών για κατανάλωση (BBCH 71-89). Μέχρι 3 εφαρμογές με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα.

Δαμασκηνιά: Για Καρπόκαψα (*Cydia funebrana*) και για χρήσεις ήσσονος σημασίας: Καφέ Βρωμούσα (*Halyomorpha halys*)*, Σποντόπερα* (*Spodoptera frugiperda*) και Δροσόφιλα (*Drosophila suzukii*)* 250 γρ.σκ./στρ.(max) ή 200 γρ.σκ./100 λίτ.ψεκ.υγρ. Όγκ.ψεκ.υγρ.: 50-125 λίτ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Έναρξη των ψεκασμών στην εκκόλαψη των ωών ή στο μέγιστο των πτήσεων χρησιμοποιώντας τις παγίδες παρακολούθησης. Από την έναρξη της ανάπτυξης του καρπού, μετά την άνθιση, έως την ωρίμανση των καρπών για κατανάλωση (BBCH 71-89). Μέχρι 3 εφαρμογές με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα.

Φάσμα δράσης: (συνέχεια):

Κερασία: Για Φυλλοδέτες (*Archips spp.*) και για χρήσεις ήσσονος σημασίας: *Ραγολέτιδα** (*Rhagoletis cerasi*), *Δροσόφιλα** (*Drosophila suzukii*), *Σποντόπετρα** (*Spodoptera frugiperda*) και *Καφέ Βρωμύουσα** (*Haliomorpha halyis*) 200 γρ.σκ./στρ.(max) ή 150 γρ.σκ./100 λίτ.ψεκ.υγρ. Ογκ.ψεκ.υγρ.: 50-150 λίτ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Από την έναρξη της ανάπτυξης του καρπού, μετά την άνθιση, έως την ωρίμανση των καρπών για κατανάλωση (BBCH 71-89). Μέχρι 3 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα.

Βερυκοκία: Για *Ανάρσια* (*Anarsia lineatella*), *Καρποκάψα* (*Grapholita molesta*) και για χρήσεις ήσσονος σημασίας: *Δροσόφιλα** (*Drosophila suzukii*), *Σποντόπετρα** (*Spodoptera frugiperda*) και *Καφέ Βρωμύουσα** (*Haliomorpha halyis*) 200-225 γρ.σκ./στρ.(max) ή 150 γρ.σκ./100 λίτ.ψεκ.υγρ. Ογκ.ψεκ.υγρ.: 50-150 λίτ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Έναρξη των ψεκασμών με το πρώτο άνοιγμα των αυγών ή στο μέγιστο των πτήσεων χρησιμοποιώντας τις παγίδες παρακολούθησης. Από την έναρξη της ανάπτυξης του καρπού, μετά την άνθιση, έως την ωρίμανση των καρπών για κατανάλωση (BBCH 71-89). Μέχρι 3 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα.

Καρυδιά: Για *Καρποκάψα* (*Cydia pomonella*) και για χρήση ήσσονος σημασίας: *Δροσόφιλα* (*Drosophila suzukii*)*, *Σποντόπετρα** (*Spodoptera frugiperda*) 200 γρ.σκ./στρ.(max) ή 150 γρ.σκ./100 λίτ.ψεκ.υγρ. Ογκ. ψεκ.υγρ.: 50-150 λίτ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Από την έναρξη της ανάπτυξης του καρπού, μετά την άνθιση, έως την ωρίμανση των καρπών για κατανάλωση (BBCH 71-89). Μέχρι 3 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα.

Καστανιά: Για *Καρποκάψα* (*Cydia spp.* (*Cydia splendana*, *Cydia fagiglandana*), *Pammene fasciana*) και για χρήσεις ήσσονος σημασίας: *Δροσόφιλα* (*Drosophila suzukii*)*, *Βαλάνινος* (*Curculio elephas*)*, *Σποντόπετρα** (*Spodoptera frugiperda*) και *Σφήκα της καστανιάς* (*Dryocosmus kuriphilus*)* 200 γρ.σκ./στρ.(max) ή 150 γρ.σκ./100 λίτ.ψεκ.υγρ. Ογκ.ψεκ.υγρ.: 50-150 λίτ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Από την έναρξη της ανάπτυξης του καρπού, μετά την άνθιση, έως την ωρίμανση των καρπών για κατανάλωση (BBCH 71-89). Μέχρι 3 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα.

Φουντουκιά (καλλιέργεια ήσσονος σημασίας):** Για *Καρποκάψα*, (*Cydia pomonella*), *Δροσόφιλα* (*Drosophila suzukii*)*, *Βαλάνινος* (*Curculio elephas*), *Σποντόπετρα* (*Spodoptera frugiperda*) 200 γρ.σκ./στρ.(max) ή 150 γρ.σκ./100 λίτ.ψεκ.υγρ. Ογκ.ψεκ.υγρ.: 50-150 λίτ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Από την έναρξη της ανάπτυξης του καρπού, μετά την άνθιση, έως την ωρίμανση των καρπών για κατανάλωση (BBCH 71-89). Μέχρι 3 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα.

Αμυγδαλιά (καλλιέργεια ήσσονος σημασίας):** Για *Καρποκάψα*, (*Cydia pomonella*), *Δροσόφιλα* (*Drosophila suzukii*), *Ευρύτομο* (*Eurytoma amygdali*), *Ανθονόμος* (*Anthonomus amygdali*), *Σποντόπετρα* (*Spodoptera frugiperda*) 200 γρ.σκ./στρ.(max) ή 150 γρ.σκ./100 λίτ.ψεκ.υγρ. Ογκ.ψεκ.υγρ.: 50-150 λίτ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Από την έναρξη της ανάπτυξης του καρπού, μετά την άνθιση, έως την ωρίμανση των καρπών για κατανάλωση (BBCH 71-89). Μέχρι 3 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα.

Φιστικιά (καλλιέργεια ήσσονος σημασίας):** Για *Ψύλλα της φιστικιάς* (*Agonoscaena pistaciae*), *Ευρύτομο της φιστικιάς* (*Eurytoma plotnikovi*), *Σκώρος* (*Stathmopoda guerini*), *Καφέ Βρωμύουσα* (*Haliomorpha halyis*), *Υφεζίνος* (*Chaetoptellus vestitus*), *Σποντόπετρα* (*Spodoptera frugiperda*) 200 γρ.σκ./στρ.(max) ή 150 γρ.σκ./100 λίτ.ψεκ.υγρ. Ογκ.ψεκ.υγρ.: 50-150 λίτ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Από την έναρξη της ανάπτυξης του καρπού, μετά την άνθιση, έως την ωρίμανση των καρπών για κατανάλωση (BBCH 71-89). Μέχρι 3 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα.

Ακτινιδιά: Για *Εούλια* (*Argyrotaenia ljungiana*) και για χρήσεις ήσσονος σημασίας: *Δροσόφιλα** (*Drosophila suzukii*), *Καφέ Βρωμύουσα** (*Haliomorpha halyis*), *Χρυσόκάνθαρο** (*Anomala vitis*), *Σποντόπετρα** (*Spodoptera frugiperda*) και *Μετκόλφ** (*Metcalfa pruinosa*) 200 γρ.σκ./στρ.(max) ή 150 γρ.σκ./100 λίτ.ψεκ.υγρ. Ογκ.ψεκ.υγρ.: 50-150 λίτ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από όταν ο καρπός έχει αποκτήσει το 10% του τελικού μεγέθους έως την πλήρη ωρίμανση για κατανάλωση (BBCH 71-89). Μέχρι 3 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα.

Παρατηρήσεις: Ανεξάρτητα από τους όγκους νερού που χρησιμοποιούνται, να τηρείτε τις δόσεις ανά στρέμμα για κάθε καλλιέργεια. *«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα: • στην καφέ βρωμούσα για τις καλλιέργειες μηλιάς, αχλαδιάς, μουσμουλιάς, κυδωνιάς, δαμασκηνιάς, ροδακινιάς, ακτινιδιάς, κερασιάς και βερυκοκιάς • στη δροσρόφιλα για τις καλλιέργειες μηλιάς, αχλαδιάς, μουσμουλιάς, κυδωνιάς, ροδακινιάς, δαμασκηνιάς, καρυδιάς, καστανιάς, ακτινιδιάς, κερασιάς και βερυκοκιάς • στο βαλάνο και στη σφήκα της καστανιάς για την καλλιέργεια της καστανιάς • στη ραγοθέτιδα για την καλλιέργεια της κερασιάς • στον χρυσοκάνθαρο και στη μετκάφη για την καλλιέργεια της ακτινιδιάς. • στη σποντόπτερα στις καλλιέργειες των μηλοειδών, της ροδακινιάς, της δαμασκηνιάς, της κερασιάς, της βερυκοκιάς, της καρυδιάς, της καστανιάς και της ακτινιδιάς. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος». **«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες της φουντουκιάς, της αμυγδαλιάς και της φιστικιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του».

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Μηλιά, Αχλαδιά, Μουσμουλιά, Κυδωνιά, Δαμασκηνιά, Καρυδιά, Καστανιά, Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Φιστικιά, Ακτινιδιά, Κερασιά, Βερυκοκιά: 7 ημέρες. Ροδακινιά: 14 ημέρες.

Φυτοτοξικότητα: Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

Συνδυαστικότητα: --

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκηλυνθεί: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία emamectin benzoate, η οποία ανήκει στην ομάδα 6 κατά IRAC. Διαχέριση ανθεκτικότητας

• Το AFFIRM Opti 9.5 WG θα πρέπει να εφαρμόζεται την κατάλληλη χρονική στιγμή, στοχεύοντας τα πλέον ευαίσθητα βιολογικά στάδια των εντομών-εχθρών.

• Αποφύγετε τις επαναλαμβανόμενες εφαρμογές με AFFIRM Opti 9.5 WG. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Οι ψεκασμοί με Affirm Opti 9.5 WG πρέπει να γίνονται μόνο μετά την άνθιση.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλή ξέπλυση (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα ή σκίασμα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

- Συνθήκες αποθήκευσης:

Στην αρχική του συσκευασία, μακριά από ήλιο και υγρασία σε καλά αεριζόμενο χώρο, με θερμοκρασία 20°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

