

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

• Φυλάσσετε κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Μην αναπνέετε σκευασματα. • Πλυθείτε αοθααστικά μετά το χειρισμό. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια. • Διάθεση περιεχομένου/ περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Υπαίθριες καλλιέργειες: • Κατά την εφαρμογή με τρακτέρ φορτάτε οδόσμιση φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος. • Κατά την χρήση ψεκαστικού μηχανήματος με εκτόξευση υποβοηθούμενη από ρεύμα αέρος (τουρμινά), πρέπει να χρησιμοποιείται τρακτέρ με κλειστή καμπίνα. • Όταν η καλλιέργεια γεινιάζει με κατοικήνη περιοχή κατά την εφαρμογή με τρακτέρ με φερόμενα ή αερόμενα μέσα να χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης διασποράς κατά 50% για την προστασία των κατοίκων. • Κατά την χρήση με ψεκαστικό μέσα χείρος (αυλός) σε χαμηλού ύψους καλλιέργειες στον αγρό, φορτάτε οδόσμιση φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος. • Κατά την χρήση με ψεκαστικά μέσα χείρος (αυλός) σε υψηλές καλλιέργειες φορτάτε γάντια μέσα ατομικής προστασίας για την αναπνοή (τύπου FP2) κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και γάντια, μέσα ατομικής προστασίας για την αναπνοή (τύπου FP2), αδιάβροχη φόρμα εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας για το κεφάλι/ μάτια και πρόσωπο κατά την εφαρμογή. • Δεν επιτρέπεται η χρήση επινώπιου ψεκαστήρα στον αγρό. • Σε περίπτωση επανεξόδου στη καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φορτάτε μακρυμάνικο πουκάμιο, μακρύ παντελόνι και γάντια. Κατά τον δολιματικό ψεκασμό στην καλλιέργεια της ελιάς με ψεκαστικά μέσα χείρος (αυλός): • Φορτάτε οδόσμιση φόρμα εργασίας, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για την αναπνοή (τύπου FP2) κατά την ανάμιξη/ φόρτωση του σκευάσματος και οδόσμιση φόρμα εργασίας και γάντια κατά την εφαρμογή • Όταν η καλλιέργεια γεινιάζει με κατοικήνη περιοχή να χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης διασποράς κατά 50% για την προστασία των κατοίκων • Δεν επιτρέπεται η χρήση επινώπιου ψεκαστήρα. Θερμοκηπιακές καλλιέργειες: • Κατά την εφαρμογή του σκευάσματος σε καλλιέργειες χαμηλής ανάπτυξης με ψεκαστικά μέσα χείρος (αυλός) φορτάτε αδιάβροχο παντελόνι, σοκάκι από βαμβάκι/ πολυέστερα και γάντια. • Κατά την εφαρμογή του σκευάσματος σε καλλιέργειες υψηλής ανάπτυξης με ψεκαστικά μέσα χείρος (αυλός) φορτάτε αδιάβροχη οδόσμιση προστατευτική ενδυμασία και γάντια. • Σε περίπτωση επανεξόδου στο θερμοκήπιο μετά τον ψεκασμό φορτάτε μακρυμάνικο πουκάμιο, μακρύ παντελόνι και γάντια.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣ ΕΞΙΣΤΗΝΗΣ: Μεταφέρατε τον πάονα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣ ΕΠΙΛΟΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Βγάλτε τα μολύβινα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Εάν παρατηρήσετε ερεθισμό του δέρματος ή εμφανιστεί ερύσμη, συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣ ΚΑΤΑΠΟΤΗΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία. ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕ ΕΜΕΤΟ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣ ΕΠΙΛΟΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Σημειώματα: Η εισπνοή μπορεί να προκαλέσει πνευμονικό οίδημα και πνευμονιτίδα. Η επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα παρασιθισίας (φαγούρι, τσουέζιμο, κνίσιμο ή μούδιασμα του εκτεθειμένου δέρματος) τα οποία είναι παροδικά και διαρκούν έως 24 ώρες. Αντιδοτό: Δεν υπάρχει γνωστό αντιδοτό. Ακοφωθείτε συμπτωματική θεραπεία. Μην προκαλέσετε εμετό: περιέχει αποσπάσματα πετρελίου και/ή αρωματικών ούλων. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολούθηστε τις οδηγίες χρήσης.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθοστρωτές επιφάνειες και τους δρόμους.



Karate® 10CS
with Zeon technology

syngenta®

GROUP 3A INSECTICIDE

UFI: TWN7-U09H-K005-16KD

Lambda-cyhalothrin (Χημική ομάδα Πυρεθρινοειδών)

Συμπυκνωμένο αιώρημα μικροκαψουλών (CS)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΔΔΑ): 1854/30-5-2005
Ημερομηνία 1ης ανανέωσης: 04.03.2024

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Lambda-cyhalothrin 10 % β/ο

Βοηθητικές ουσίες 89,5 % β/β

Ευρέως φάσματος πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο. Δρα δια επαφής και δια στομάχου με προληπτική και κατασταλακτική δράση για την αντιμετώπιση μυζητικών καθώς και μασητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ

Α. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49

Τηλ.: 210 6666612-13 www.syngenta.gr

ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΛ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 lt e

ΠΡΟΣΟΧΗ



- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει lambda-cyhalothrin και 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.
- Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
- Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα υστερά από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση μέσω της στοματικής και δερματικής οδού.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς:

- Σε μηλιά, αχλαδιά, ροδακινιά και καστανιά: Να αφαιρέτε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 25 μέτρων, εκ των οποίων τα 20 μέτρα να είναι ζώνη φυτικής ανάσχεσης και με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90 %.
- Στο αμπέλι – πρώιμη εφαρμογή: Να αφαιρέτε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων, εκ των οποίων 20 μέτρα ζώνη φυτικής ανάσχεσης ή μια ζώνη φυτικής ανάσχεσης 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 50 %.
- Στο αμπέλι – ψυχή εφαρμογή: Να αφαιρέτε μια ζώνη φυτικής ανάσχεσης 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90 %.
- Στην ελιά: Να αφαιρέτε μια ζώνη φυτικής ανάσχεσης 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90 %.
- Στο βαμβάκι: Να αφαιρέτε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 50 %.
- Σε λοιπές υπαίθριες καλλιέργειες (πατάτα, τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι, κολοκυθάκι, φακή, λίκανο, μπρόκολο): Να αφαιρέτε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 40 μέτρων εκ των οποίων 20 μέτρα ζώνη φυτικής ανάσχεσης ή να αφαιρέτε μια ζώνη φυτικής ανάσχεσης 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 50 %.
- Σε καλλιέργειες θερμοκηπίου (τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι, κολοκυθάκι) που γεινιάζουν με υδάτινες επιφάνειες: Να αφαιρέτε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 40 μέτρων, εκ των οποίων 20 μέτρα ζώνη φυτικής ανάσχεσης ή να αφαιρέτε μια ζώνη φυτικής ανάσχεσης 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς κατά 50 %.

- Για να προστατέψετε τα αθροιστικά μη στόχευα: • Σε δένδρωδεις καλλιέργειες: Να αφαιρέτε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90 %.
- Στο αμπέλι: Να αφαιρέτε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή να αφαιρέτε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 60 % ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης διασποράς κατά 90 %.
- Στο βαμβάκι: Να αφαιρέτε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90 %.
- Σε λοιπές καλλιέργειες υπαίθρου (πατάτα, τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι, κολοκυθάκι, φακή, λίκανο, μπρόκολο): Να αφαιρέτε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 30 %.
- Στις καλλιέργειες θερμοκηπίου (τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι, κολοκυθάκι) με ύψος < 50 εκ.: Να αφαιρέτε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή να χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 50 %.
- Στις καλλιέργειες θερμοκηπίου (τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι, κολοκυθάκι) με ύψος > 50 εκ.: Να αφαιρέτε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή να χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90 %.

Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Μην το χρησιμοποιείτε όταν υπάρχουν ζιζάνια σε ανθοφορία (απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους). Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την ανθοφορία της καλλιέργειας ή κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. **Πολύ τοξικό σε βομβίνους και ωφέλιμα έντομα και ακάρεα που χρησιμοποιούνται σε θερμοκήπια.**

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Το σκεύασμα, είναι ευρέως φάσματος πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο με προληπτική και κατασταλτική δράση για την αντιμετώπιση μυζητικών και μαστικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες. Δρα διά επαφής και διά στομάχου επιδρώντας στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na⁺ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μία συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος διαφόρων καλλιεργειών και δολωματικός ψεκασμός στην ελιά.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζετε το ψεκαστικό δοχείο με τη μισή ποσότητα νερού από την απαιτούμενη. Αραιώνετε την απαιτούμενη δόση σκευάσματος με μία μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και κατόπιν ρίχνετε το διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώνετε με το υπόλοιπο νερό ενώ αναδεύετε συνεχώς.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλή ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: --

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

- Απαγορεύεται η εφαρμογή του σκευάσματος με επινώτιους ψεκαστήρες σε αγρό και θερμοκήπιο.
- Μην το εφαρμόζεται σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλη ποσότητα μελιτώματος αφίδων στην περιοχή εφαρμογής.
- Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία lambda-cyhalothrin η οποία ανήκει στην ομάδα 3 κατά IRAC. Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται:
 - Η εναλλαγή με εντομοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
 - Για τον έλεγχο εχθρών υψηλού κινδύνου, να εφαρμόζεται το σκεύασμα σε προγράμματα ελέγχου που περιλαμβάνουν χημικές και βιολογικές μεθόδους, ωφέλιμα έντομα, καλλιεργητικές πρακτικές, εντομοεπικυστικά κ.α.
 - Χρήση καλλιεργητικών πρακτικών ή και πρακτικών βιολογικού ελέγχου.
 - Χρήση ανθεκτικών ή πρώιμων ποικιλιών ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων.
 - Να ρυθμίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής και να χρησιμοποιείται τις προτεινόμενες πιέσεις και δόσεις ψεκαστικού διαλύματος.
 - Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/ στόχων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη ζώνη πριν στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στη φυλλική επιφάνεια. Η επανείσοδος στον αμπελώνα επιτρέπεται μόνο αφού περάσουν 4 ημέρες από την εφαρμογή του σκευάσματος φορώντας γάντια.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό έως 2 (δύο) χρόνια στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και σε θερμοκρασία μικρότερη των 40°C.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Πατάτα, Ελιά επιτραπέζια, Ελιά ελαιοποιήσιμη, Λάχανο, Μηρόκοθο, Καστανιά: 7 ημέρες,

Τομάτα (Υ + Θ), Μελιτζάνα (Υ + Θ), Πιπεριά (Υ + Θ), Αγγούρι (Υ + Θ), Κολοκύθι (Υ + Θ): 3 ημέρες, **Βαμβάκι, Φακή, Αμπέλι επιτραπέζιο, Αμπέλι οиноποιήσιμο:** 14 ημέρες.

Φάσμα δράσης (πεδίο εφαρμογής, στόχοι, δόσεις σκευάσματος, τρόπος & χρόνος εφαρμογής, μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο):

Μηλιά: Για Φυλλορρόκτη (Phyllonorycter sp.) και για Χρήση ήσσονος σημασίας: Σποντόπτερα* (Spodoptera frugiperda) 10 κ.εκ.οκ./στρέμ. Όγκος ψεκ/κού υγρού: 100-150 λίτ./στρέμ. Μία (1) εφαρμογή με ψεκασμό φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των πρώτων φύλλων έως και την συγκομιδή (BBCH 19-89).

Αχλαδιά: Για Φυλλορρόκτη (Phyllonorycter sp.), Ψύλλη (Cacopsylla pyri) και για Χρήση ήσσονος σημασίας: Σποντόπτερα* (Spodoptera frugiperda) 10 κ.εκ.οκ./στρέμ. Όγκος ψεκ/κού υγρού: 100-150 λίτ./στρέμ. Μία (1) εφαρμογή με ψεκασμό φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των πρώτων φύλλων έως και την συγκομιδή (BBCH 19-87).

Ροδακινιά: Για τον Φυλλοδόκτη (Adoxophyes orana) και για Χρήση ήσσονος σημασίας: Σποντόπτερα* (Spodoptera frugiperda) 10 κ.εκ.οκ./στρέμ. Όγκος ψεκ/κού υγρού: 100-150 λίτ./στρέμ. Μία (1) εφαρμογή με ψεκασμό φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των πρώτων φύλλων έως και την συγκομιδή (BBCH 19-89).

Αμπέλι (επιτραπέζια και οινόποισιμα σταφύλια): Για την Ευδεμία (Lobesia botrana), Κοχυλίδα (Eupoecilia ambiguella) και για Χρήση ήσσονος σημασίας: Σποντόπτερα* (Spodoptera frugiperda) 10-25 κ.εκ.οκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού ή 10 κ.εκ.οκ./στρέμ. Όγκος ψεκ/κού υγρού: 40-100 λίτ./στρέμ. Μία (1) εφαρμογή με ψεκασμό φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των βλαστοφόρων ορθοσθίων έως τη συγκομιδή (BBCH 09-89).

Ελιά: • Για τον Πυρηνωτήρητη (Prays oleae) και για Χρήση ήσσονος σημασίας: Σποντόπτερα* (Spodoptera frugiperda) 10 κ.εκ.οκ./στρέμ. Όγκος ψεκ/κού υγρού: 50-200 λίτ./στρέμ. Μία (1) εφαρμογή με ψεκασμό φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών και την εκκόλαψη των ωών από το στάδιο όπου τα εξωτερικά μικρά φύλλα ανοίγουν και διασταυρώνονται κοντά στην κορυφή τους έως ότου ο καρπός έχει αποκτήσει το 50% του τελικού του μεγέθους (ξεκινάει η σκλήρυνση του πυρήνα) (BBCH 09-75). • Για τον Δάκο (Bactrocera oleae) 125 κ.εκ.οκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού ή 3,75 κ.εκ.οκ./στρέμ. Όγκος ψεκ/κού υγρού: 3 λίτ./στρέμ. (Εφαρμογή 300 κ.εκ. ψεκ/κού υγρού/ δέντρο. Μέγιστος αριθμός ψεκασμένων δέντρων ανά στρέμμα: 10). Μέχρι δύο (2) εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημερών. Δολωματικό ψεκασμό από το έδαφος σε συνδυασμό με ENTOMELA 50 SL ή ENTOMELA 75 SL ή DACUS BAIT 100 στις εγκεκριμένες δόσεις, σύμφωνα με τις συλλήψεις ακμαίων στις δακοπαγίδες. Να εφαρμόζεται σε μικρή επιφάνεια κάθε 2^{ου} δέντρου του ελαιώνα.

Τομάτα (Υ & Θ), Πιπεριά (Υ & Θ), Μελιτζάνα (Υ & Θ): Για Αφίδες (Myzus persicae), Πράσινο ακουλήκη (Helicoverpa armigera), Σποντόπτερα (Spodoptera sp.) Δορυφόρο (Leptinotarsa decemlineata) 10 κ.εκ.οκ./στρέμ. ή 10-20 κ.εκ.οκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού (Υ) και 6,6-20 κ.εκ.οκ./ 100 λίτ. ψεκ. υγρού (Θ). Όγκος ψεκ/κού υγρού: 50-100 λίτ./στρέμ. (Υ) και 50-150 λίτ./στρέμ. (Θ). Μία (1) εφαρμογή με ψεκασμό φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κοτυλιδίων έως την συγκομιδή (BBCH 09-89).

Αγγούρι (Υ & Θ), Κολοκύθι (Υ & Θ): Για Αφίδες (Myzus persicae), Πράσινο ακουλήκη (Helicoverpa armigera), Σποντόπτερα (Spodoptera spp) 10 κ.εκ.οκ./στρέμ. ή 10-20 κ.εκ.οκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού (Υ) και 6,6-20 κ.εκ.οκ./ 100 λίτ. ψεκ. υγρού (Θ). Όγκος ψεκ/κού υγρού: 50-100 λίτ./στρέμ. (Υ) και 50-150 λίτ./στρέμ. (Θ). Μία (1) εφαρμογή με ψεκασμό φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κοτυλιδίων έως την συγκομιδή (BBCH 09-89).

Λάχανο, Μηρόκοθο: Για Πιερίδα (Pieris brassicae), Μαμέστρα (Mamestra brassicae) και για Χρήση ήσσονος σημασίας: Σποντόπτερα* (Spodoptera frugiperda) 7,5-10 κ.εκ.οκ./στρέμ. Όγκος ψεκ/κού υγρού: 50-100 λίτ./στρέμ. Μία (1) εφαρμογή με ψεκασμό φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κοτυλιδίων έως την συγκομιδή (BBCH 09-89).

Φακή: Για τον Βρούχο (Bruchus sp.) και για Χρήση ήσσονος σημασίας: Σποντόπτερα* (Spodoptera frugiperda) 10 κ.εκ.οκ./στρέμ. ή 10 κ.εκ.οκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ/κού υγρού: 100 λίτ./στρέμ. Μία (1) εφαρμογή με ψεκασμό φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κοτυλιδίων έως την συγκομιδή (BBCH 09-89).

Πατάτα: Για τον Δορυφόρο (Leptinotarsa decemlineata) και για Χρήση ήσσονος σημασίας: Σποντόπτερα* (Spodoptera frugiperda) 10 κ.εκ.οκ./στρέμ. Όγκος ψεκ/κού υγρού: 50-80 λίτ./στρέμ. Μία (1) εφαρμογή με ψεκασμό φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κοτυλιδίων έως την συγκομιδή (BBCH 09-49).

Βαμβάκι: Για Πράσινο ακουλήκη (Helicoverpa armigera), Ρόδινο ακουλήκη (Pectinophora gossypiella), Αφίδες (Aphis gossypii, Myzus sp) και για Χρήση ήσσονος σημασίας: Σποντόπτερα* (Spodoptera frugiperda) 15 κ.εκ.οκ./ στρέμ. Όγκος ψεκ/κού υγρού: 50-80 λίτ./στρέμ. Για το Πράσινο ακουλήκη και το Ρόδινο ακουλήκη: Μία (1) εφαρμογή με ψεκασμό φυλλώματος από την έναρξη της άνθησης έως την έναρξη ανοίγματος των καρυδίων (BBCH 60-81). Για τις Αφίδες και την Σποντόπτερα: Μία (1) εφαρμογή με ψεκασμό φυλλώματος όταν ο πληθυσμός αρχίζει και αυξάνει σε επίπεδο προβλήματος από το στάδιο της εμφάνισης του 1ου πρώτου αληθινού φύλλου έως την έναρξη ανοίγματος των καρυδίων (BBCH 11-81).

Καστανιά (χρήση ήσσονος σημασίας):** Για Καρποκαψα (Cydia sp.), Σποντόπτερα (Spodoptera frugiperda) 10 κ.εκ.οκ./στρέμ. Όγκος ψεκ/κού υγρού: 100-200 λίτ./στρέμ. Μία (1) εφαρμογή με ψεκασμό φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της εμφάνισης των πράσινων κορυφών έως και τη συγκομιδή (BBCH 09-89).

Παρατηρήσεις: 1. Να ρυθμίσετε τη δόση στο εκατόλιτρο ώστε να μην υπερβαίνει την μέγιστη δόση σκευάσματος ανά στρέμμα. 2. Η χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει και τη νεκταρινιά.

*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά των Spodoptera frugiperda στις καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς, της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς, του αμπελιού, της ελιάς, του λάχανου, του μηρόκοθου, της φακής, της πατάτας και του βαμβάκιου. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

**«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της καστανιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του».

