

Katana®

Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών πλατύφυλλων ζιζανίων και αγρωστωδών ζιζανίων, προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, σε αμπέλι, ελιά, εσπεριδοειδή, μηλοειδή και πυρηνόκαρπα.

Καθαρό βάρος: 50γραμ.

Εγγυημένη σύνθεση: **ΕΝΔΙΟΡΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG)**
Flazasulfuron (Φλαζασουλφουρον) 25% β/β, Βοηθ. ουσίες: 74 % (β/β)
ΑΑΔΑ: 70.161/27.05.2016 **UFI: 5M12-KQ54-0N0U-SUP9**



ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Κάτοχος της έγκρισης: ISK Biosciences Europe N.V., Pegasus Park, De Kleetlaan 12B box 9, B-1831 Diegem, Βέλγιο

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
Γ' γλυμ. Α. Παπανίσις Μαρκοπούλου, Τ.Θ. 100, 19002, Παλαιά, Τηλ.: 210.68.00.900, info@hellafarm.gr, www.hellafarm.gr



Ημ/νία παραγωγής, Αρ. Παρτίδος: βλ. επί της συσκευασίας

259

Διαβάστε τις συνημμένες οδηγίες πριν από τη χρήση ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΔΩ



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτική ενδυμασία/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ το πρόσωπο.Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμειξη/φόρτωση, την εφαρμογή, τον χειρισμό και τον καθαρισμό του ψεκαστικού εξοπλισμού. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας. Συστήνεται η χρήση γαντιών. Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.) Για να προστατέψετε τα υπόγεια ύδατα μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει Flazasulfuron περισσότερο από 1 φορά ανά 2 έτη για εφαρμογή στη συνολική επιφάνεια του αγρού. Για να προστατέψετε τα υπόγεια ύδατα, το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στις γραμμές φύτευσης καλύπτοντας το 33% της συνολικής επιφάνειας του αγρού. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό σε αλκαλικά εδάφη στη συνολική επιφάνεια του αγρού. - Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα: - φυτική ζώνη ανάσχεσης **20 μέτρων** για την καλλιέργεια του αμπελιού - μια αφέκαστη ζώνη προστασίας **20 μέτρων** συμπεριλαμβανομένης φυτικής ζώνης ανάσχεσης **10 μέτρων** για τις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών και της ελιάς.

-μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων, για τις καλλιέργειες της Μηλιάς, Αχλαδιάς, Ροδακινιάς, Βερικοκιάς, Κερασιάς, Δαμασκηιάς, σε εφαρμογές στη συνολική επιφάνεια του αγρού. - μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων για τις καλλιέργειες της Μηλιάς, Αχλαδιάς, Ροδακινιάς, Βερικοκιάς, Κερασιάς, Δαμασκηιάς σε όξινα εδάφη και εφαρμογές στο 33% της συνολικής επιφάνειας του αγρού. -αφέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων συμπεριλαμβανόμενης μιας φυτικής ζώνης ανάσχεσης 5 μέτρων για τις καλλιέργειες της Μηλιάς, Αχλαδιάς, Ροδακινιάς, Βερικοκιάς, Κερασιάς, Δαμασκηιάς σε αλκαλικά εδάφη και εφαρμογές στο 33% της συνολικής επιφάνειας του αγρού. Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από μη γεωργική γη ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%**. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλέσετε εμετό. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210793777**

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέπ Φρουτ)(από το 4ο έτος φύτευσης της καλλιέργειας): α) Για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων και πολυετών ζιζανίων. Μία (1) εφαρμογή με κατευθυνόμενο ψεκασμό στην γραμμή φύτευσης, προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων καλύπτοντας το 33% της συνολικής επιφάνειας του αγρού (Ιούνιος-Αύγουστος) με δόση 20 γρ / στρέμμα (μέγιστο) ή 50-100 γρ. / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού, β) Για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων [*Portulaca oleracea* (Αντράκλα), *Amaranthus retroflexus* (τραχύ Βλήτο)]. Μία (1) εφαρμογή με κατευθυνόμενο ψεκασμό των ζιζανίων όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε ανάπτυξη με δόση 6 – 8 γρ / στρέμμα σε συνδυασμό με Roundup Gold 36 SL, Rodeo TF ή Gialka TF σε δόση 240 ml/ στρέμμα ή με Roundup Ultra σε δόση 180 ml/ στρέμμα. **Μηλιά, Αχλαδιά & Ροδακινιά, Βερικοκιά,Κερασιά, Δαμασκηινιά (από το 4ο έτος φύτευσης της καλλιέργειας):** α) Για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων και πολυετών ζιζανίων με δόση 8 γρ./ στρέμμα (μέγιστο). Μία (1) εφαρμογή με κατευθυνόμενο ψεκασμό στην γραμμή φύτευσης σε λωρίδες πλάτους 1 m, καλύπτοντας το 33% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων (Φεβρουάριος- Ιούνιος). **Μία (1) εφαρμογή ανά δύο χρόνια** με κατευθυνόμενο ψεκασμό των ζιζανίων σε όλη την επιφάνεια του αγρού, προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων (Φεβρουάριος- Ιούνιος). **Ελιά (από το 4ο έτος φύτευσης της καλλιέργειας):** α) Για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων και πολυετών ζιζανίων. Μία (1) εφαρμογή με κατευθυνόμενο ψεκασμό στην γραμμή φύτευσης, προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά καλύπτοντας το 33% της συνολικής επιφάνειας του αγρού (Οκτώβριος- Μάρτιος) με δόση 20 γρ / στρέμμα (μέγιστο) ή 50-100 γρ. / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού.

β) Για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων [*Calendula arvensis* (Καλέντουλα), *Erodium malacoides* (Βελονίδα μαλακοειδής), *Malva neglecta*, (Μολόχα), *Borrago Officinalis* (Βόραγο), *Mercurialis annua* (Σκαρολάχανο), *Oxalis cernua* (Οξαλίδα)]. Μία (1) εφαρμογή με κατευθυνόμενο ψεκασμό των ζιζανίων όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε ανάπτυξη με δόση 6 – 8 γρ / στρέμμα σε συνδυασμό με Roundup Gold 36 SL, Rodeo TF ή Glialka TF σε δόση 179,4-240 ml/ στρέμμα ή με Roundup Ultra σε δόση 134,5-180 ml/ στρέμμα. γ) Για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων [*Calendula arvensis* (Καλέντουλα), *Diploaxis virgata*, *Erodium malacoides* (βελονίδα μαλακοειδής), *Urtica dioica* (Πολυετής τσουκνίδα), *Stellaria media* (Στελλάρια), *Lamium amplexicaule*, (δωδεκάνθη), *Malva neglecta* (Μολόχα), *Senecio vulgaris* (Μαρτιάκος), *Malva sylvestris* (κοινή μολόχα)]. Μία (1) εφαρμογή με κατευθυνόμενο ψεκασμό των ζιζανίων όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε ανάπτυξη με δόση 6 – 8 γρ / στρέμμα σε συνδυασμό με Roundup Gold 36 SL, Rodeo TF ή Glialka TF σε δόση 200-264,4 ml/ στρέμμα ή με Roundup Ultra σε δόση 150-198,3 ml/ στρέμμα. **Αμπέλι (από το 4ο έτος φύτευσης της καλλιέργειας):** α) Για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων και πολυετών ζιζανίων. Μία (1) εφαρμογή με κατευθυνόμενο ψεκασμό στην γραμμή φύτευσης, προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά καλύπτοντας το 33% της συνολικής επιφάνειας του αγρού (Φεβρουάριος- Απρίλιος) με δόση 20 γρ / στρέμμα (μέγιστο) ή 50-100 γρ. 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. β) Για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων [*Veronica persica* (Βερόνικα), *Sonchus arvensis* (πολυετής ζωχός)]. Μία (1) εφαρμογή με κατευθυνόμενο ψεκασμό των ζιζανίων όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε ανάπτυξη με δόση 6 γρ /στρέμμα σε συνδυασμό με Roundup Gold 36 SL, Rodeo TF ή Glialka TF σε δόση 200 ml/ στρέμμα ή με Roundup Ultra σε δόση 150 ml/ στρέμμα.

Για όλες τις καλλιέργειες: Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρέμμα): 20-40. **Παρατηρήσεις:** 1. Η ποσότητα σκευάσματος και ψεκαστικού υγρού που εφαρμόζονται στη γραμμή φύτευσης, θα πρέπει να υπολογίζεται βάση της πραγματικής επιφάνειας που θα ψεκαστεί. Για παράδειγμα σε αμπελώνα με απόσταση γραμμών φύτευσης 3 μέτρα, θα ψεκαστεί το 1/3 περίπου της συνολικής επιφάνειας του αμπελώνα. Ανάλογα υπολογίζεται και η ποσότητα του glyphosate. 2. Ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με δενδρύλλια, φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος και καρπούς. 3. Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα στο ΚΑΤΑΝΑ μέχρι το στάδιο των 2 – 4 φύλλων ή έως τα 10 εκ. ύψος. 4. Τα αποτελέσματα παρατηρούνται 5 – 10 ημέρες μετά τον ψεκασμό, ανάλογα με τη θερμοκρασία. 5. Ο συνδυασμός του με glyphosate, δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται χαμηλότερες δόσεις του ΚΑΤΑΝΑ (6 έως 8 γραμ./στρ), σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ανάγκη για υπολειμματική διάρκεια δράσης του ζιζανιοκτόνου. 6. Για να επιτευχθεί μεγαλύτερη διάρκεια δράσης, να αποφεύγονται οργώματα ή φρεζαρίσματα ένα μήνα πριν και 2 εβδομάδες μετά την εφαρμογή και να χρησιμοποιείτε τη μεγαλύτερη δόση/αναλογία ΚΑΤΑΝΑ. 7. Ο συνδυασμός του με glyphosate, είναι ιδιαίτερα σημαντικός στις φθινοπωρινές εφαρμογές στην ελιά (σε φυτρωμένα ζιζάνια μετά τις βροχές), γεγονός που διευκολύνει τη συγκομιδή αφήνοντας το χίμα γύρω από τα δέντρα, καθαρό από ζιζάνια. 8. Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια Malva spp (μολόχα), Portulaca oleraceae (αντράκλα) και Urtica spp. (τσουκνίδα) η δόση του glyphosate στο μίγμα βυτίου, μπορεί να αυξηθεί σε 144 γρ. δ.ο/ στρέμμα ψεκαζόμενης έκτασης, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης τους.

9. Η χρήση στη λεμονιά περιλαμβάνει την κητριά. 10. Δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις σε καλλιέργειες της Ροδακινιάς, Βερικοκιάς, Κερασιάς, Δαμασκηνιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος σε αυτές τις καλλιέργειες να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα. **Καταπολεμούμενα Ζιζάνια Ευαίσθητα ζιζάνια:** Bromus sterilis (αγριοβρώμη)*, Digitaria sanguinalis (αιματόχορτο), Lolium multiflorum. (Ήρα πολύανθη) *, Setaria verticillata, S. viridis (Σετάρια), Amaranthus retroflexus (Βλήτο τραχύ) *, Capsella bursa-pastoris (Καφέλλα) *, Chenopodium album (Λουβουδιά), Conyza canadensis * (Κόνυζα), Crepis sancta * (Πικραλίδα), Daucus carota (Αγριοκαρότο), Epilobium tetragonum (Επιλόβιο), Erodium cicutarium (Βελονίδα), Geranium dissectum, G. rotundifolium, G. mole ** (Γεράνι), Malva sp. ** (Μολόχα), Picris echioides * (Πικρίδα), Mercurialis annua (Σκαρολάχανο), Senecio vulgaris (Μαρτιάκος), Stellaria media (Στελλάρια), Taraxacum officinale (Αγριοράδιχο). **Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:** Poa annua (Πόα ετήσια) *, Lactuca serriola * (Αγριομάρουλο), Sonchus asper, S. oleraceus (Ζωχόι). **ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ, ΚΕΡΑΣΙΑ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ Ευαίσθητα:** Poa annua (Κοινή Πόα), Setaria viridis (Πράσινη Σετάρια), Taraxacum officinale * (Αγριοράδιχο), Lysimachia arvensis ** (Ανααλλίδα), Malva sylvestris ** (Κοινή Μολόχα), Polygonum sp.** (Πολυκόμμι), Senecio vulgaris ** (Μαρτιάκος), Lolium multiflorum ** (Πολύανθη Ήρα), Trifolium sp. ** (Τρίφυλλο) **Μετρίως ευαίσθητα:** Amaranthus sp. ** (Βλήτο), Chenopodium album ** (Λουβουδιά), Helminthotheca echioides ** (Χοιροβότανο), Convolvulus arvensis ** (Περικοκιάδα), Poa sp. ** (Πόα). *Καταπολεμούνται καλύτερα προφυτρωτικά ** Καταπολεμούνται καλύτερα μεταφυτρωτικά.

Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με τα σκευάσματα Roundup Gold 36 SL, Roundup Ultra 48 SL, Rodeo TF και Glialka TF σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα. Προσθέστε πρώτα το KATANA στο ψεκαστικό υγρό και μετά το άλλο σκεύασμα. **Τρόπος δράσης:** Απορροφάται από το φύλλωμα και τις ρίζες των ζιζανίων, μετακινείται μέσω της αποπλαστικής και συμπλαστικής οδού και συγκεντρώνεται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς, παρεμποδίζοντας την ανάπτυξή τους. **Τρόπος εφαρμογής:** Κατευθυνόμενος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων, χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τους τρυφερούς βλαστούς, τα άνθη, τις παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος των καλλιεργειών. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI). **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος μέσα στο ψεκαστικό δοχείο υπό ανάδευση. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού. Εφαρμόστε αμέσως μετά την προετοιμασία του ψεκαστικού υγρού. **Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: -Μην ψεκάζετε εάν αναμένεται βροχή μέσα σε 6 ώρες. -Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. -Να μην εφαρμόζεται σε αμπέλια που βρίσκονται σε κακή κατάσταση λόγω ασθενειών. -Να μην εφαρμόζεται σε ελαφριά εδάφη. -Να μην ψεκάζετε τα πράσινα τμήματα των καλλιεργειών (οφθαλμούς που έχουν ανοίξει, φύλλα, τσαμπιά, βλαστούς, κλπ.), άμεσα ή έμμεσα.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική flazasulfuron, η οποία ανήκει στην ομάδα 2 κατά HRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα), προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:** Σε περίπτωση που ξεριζωθούν τα δένδρα, μπορεί να σπαρούν σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη ή καλαμπόκι, ένα χρόνο μετά την τελευταία εφαρμογή με το KATANA. **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φύλλα. **Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Εσπεριδοειδή 45 ημέρες, Αμπέλι 75 ημέρες, Ελιά 45 ημέρες, Μήλα, Αχλάδια, Ροδάκινα, Βερίκοκα, Κεράσια, Δαμάσκηνα 60 ημέρες. **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.