ROUNDUP® GOLD (Ραουντάπ Γκολντ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστώδων, πλατύφυλλων ζιζανίων), υδροχαρών ζιζανίων και ξυλωδών φυτών. Απορροφάται από τα φύλλα και τους τριφερείς βλαστούς των ζιζανίων και παραμένει/δίδεται το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων. **ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμοστικό κήπου με καλλιεργούμενα φυτά, εφαρμοστικό κήπου χωρίς κήπιαο καλλιέργειά ή άλλα επιθυμητά φυτά:** συστηρό ενταιναμένη εφαρμογή με ψεκαστήρα νερού. **Εφαρμοστικό κήπου πριν τη σπορά ή φύτευση της όποιας καλλιέργειας ή μετά τη συγκομιδή των καλλιεργειών:** καθαλικός ψεκασμός. Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 200-400 κυβικά εκατοστά για 10 τετραγωνικά μέτρα (20 έως 40 κυβικά εκατοστά για 1 τετραγωνικό μέτρο) και χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τους τριφερείς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγήν φυτοτοξικότητας ή συσσώρευσης υπολειμμάτων στους καρπούς. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου ακούλης και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI). **ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού υπαινήλματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος μέσα στο ψεκαστικό δοχείο υπό ανάδευση. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Να μη χρησιμοποιείτε σκόβαρο ή σκληρό νερό για τη διάλυση του φαρμάκου. **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό δοχείο. Ξεπλύνετε το δοχείο και άλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και σταγονοποιείτε και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Το κενό μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοκεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται ηπιάζ ξέπλυμα (πα νερό του ξεπλύματος τα ρίνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, γα τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ενσταιοβένται σε σημεία αιλλιάνγς, γα ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:** • Να αποφεύγεται οποιοδήποτε επαφή των καρπών με το ψεκάσιμο ή με το ψεκάσμα σε μικρή ακτίνα γύρω από τα δένδρα στο οποίο έχει εφαρμοστεί. • Να μην εφαρμόζεται σε ώρες κυρφαιών και σε σπανιά κοντάκια. • Να μην εφαρμόζεται σε υδάτινες περιοχές ή σε εδάφη που γειτνιάζουν άμεσα με υδάτινες περιοχές συμπεριλαμβανομένων των κανονικών και των ανοιχομένων των αρυζώνων. • Να μην επιτρέπεται η βόσκηση ζώων σε αγρούς μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας στους οποίους έχει εφαρμοστεί το ψεκάσιμο. • Να μη γίνεται ψεκασμός αν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες από τον ψεκασμό. • Να μη χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες που προορίζονται για σποροπαραγωγή. • Για τις επιφανείες ελές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από τα δένδρα. • Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή στις περιμέτες στο έδαφος ελές. • Να μη αιλλέγονται ελές από το έδαφος προκειμένου να σπορευθούν υπολείμματα. **Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Το ψεκάσιμο περιέχει το δραστικό glyphosate, η οποία ανήκει στην ομάδα 9 κατά HRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα ή/και εναλλακτικές μέθοδοι συνμφύτισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα), προκειμένου να αποφευθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας. **ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ: - ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:** Σε αγρούς μετά την συγκομιδή και πριν την καταγγαία του εδάφους για σπορά να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ημερών για τα ετήσια ζιζάνια και δεκαπέντε (14) ημερών για τα πολυετή ζιζάνια πριν την καταγγαία του εδάφους. **- ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:** Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φύλλα. Να μην επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων σκάμα και όπου αυτή ξεραθεί. **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:** Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στη συνιπάμενες χρήσεις και δόσεις. **ΣΥΝΗΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αερζόμενο παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνα από την ημερομηνία παρασκευής του. **ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: • Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. • Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: • Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Πλύνετε τα χέρια σαλοπτικά μετά τον ψεκασμό. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.**

•Να φοράτε προστατευτικά γάντα / προστατευτική ενδυμασία/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ το πρόσωπο. • Σε περίπτωση επαφαινοσόδου στην ψεκασμένη περιοχή φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και μπότες.- Φοράτε πάντα γάντια κατά τη χρήση. - Φοράτε κατάλληλες μπότες. - Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας. - Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. - Μην ξεπλένετε το ψεκαστικό δοχείο κοντά σε νεροχύτες, επιφανειακά ύδατα ή πηγές νερού όπως για παράδειγμα πηγάδι. - Φροντίστε να μην έχουν πρόσβαση στην ψεκασμένη περιοχή παιδιά και κατοικίδια ζώα για τουλάχιστον 24 ώρες μετά τον ψεκασμό. • Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

• Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφεύγεθε η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποκέτευσης από τις λιθόστρωες επιφάνειες και τους δρόμους.) • Για να προστατέψετε το φυτά μη-στόχους να σφάλετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90%.

ΠΡΟΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ–ΑΝΤΙΔΟΤΟ Γενικά: Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Μεταφέρετε και τοποθετείστε τον παθόντα σε σταθερή (πλάγια) θέση. Αφαιρέστε ομέως τα μολυσμένα ρούχα και απορρίπτε τα με ασφάλεια. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία. Καλέστε ομέως ένα γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Ξεπλύνετε ομέως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Βγάλτε ομέως τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Επισκεφθείτε γιατρό σε περίπτωση που δεν υποχωρεί ο ερεθισμός. **• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, σφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. • Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης:** ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Εδοποιείστε ομέως ένα γιατρό ή ένα κέντρο δηλητηριάσεων. Ξεπλύνετε το στόμα. **Πληροφορίες για το γιατρό:** Συστήνεται καταλλήλη υποστηρικτική και συμπτωματική θεραπεία όπως αυτή ενδείκνυται από την κατάσταση του ασθενή. Η θεραπεία με ατροπίνη και οξέως δεν ενδείκνυται. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Roundup® 36 SL GOLD

Glyphosate (γκλυφοζέιτ) ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (SL)

Εγγυημένη σύνθεση:
Δραστική ουσία: glyphosate 36% β/ο
(υπό μορφή άλατος Καλίου: 44,1% β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: 39% β/β

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά ΥΑΑΤ:
70172/EP / 02.09.2016

Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων), υδροχαρών ζιζανίων και ξυλωδών φυτών.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Προορίζεται για εραστέχνες χρήστες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος επικοινωνίας, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Αγησιλάου 6-8,
151 23 Μαρούσι, Τηλ.: 210 6166000
www.cropscience.bayer.gr

GROUP 9 HERBICIDE

UFI: KPF1-E0Y7-K009-RH2Q

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: Γκελλαφαρμ ΟΕ
Αθήνα: 1ο χλμ. Λ. Παιανίας - Μαρκοπούλου, Τ.Θ.100, 19002, Παιανία, Τηλ:210 6800 900
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1203, ΒΙ.ΠΕ.Θ., Σίνδος 57022, Τηλ: 2310 797907
info@hellafarm.gr, www.hellafarm.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 500 κ.εκ.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΤΟΧΟΣ, ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ημέρες) (M.A.E./M.E): • **ΕΡΑΣΤΕΧΝΙΚΟ ΚΗΠΟ ΜΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΑ ΦΥΤΑ ΟΠΟΣ: ΤΟΜΑΤΟΚΑΛΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ, ΛΕΜΟΝΙΑ, ΓΚΡΕΙΠΦΡΟΥΤ, ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ, ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ, ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΚΕΡΑΣΙΑ, ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζες & Οινοποιήσιμες ποικιλίες), ΕΛΙΑ (Επιτραπέζες & Ελαιοποιήσιμες ποικιλίες):**

α) Ετήσια ζιζάνια (Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα): Κατευθυνόμενος ψεκασμός επί της γραμμής της δενδροστοιχίας όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης. **Δόση:** 2 κ.εκ./10 τμ. (5 κ.εκ./1 λίτρο ψεκ. υγρού). **Μολόκα** (*Malva* sp.), **Αντράκλα** (*Portulaca oleracea*), **Πολυκόμπι** (*Polygonum* spp.), **Τσουκνίδα** (*Urtica* sp.): **Δόση:** 6 κ.εκ./10 τμ. (15 κ.εκ./1 λίτρο ψεκ. υγρού). **M.A.E/M.E:** 1-3/28.

β) Πολυετή ζιζάνια (Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα): Κατευθυνόμενος ψεκασμός επί της γραμμής της δενδροστοιχίας όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή. **Δόση:** 5-8 κ.εκ./10 τμ. (12,5-20 κ.εκ./1 λίτρο ψεκ. υγρού). **Αγριάδα** (*Cynodon dactylon*): **Δόση:** 8 κ.εκ./10 τμ. (20 κ.εκ./1 λίτρο ψεκ. υγρού). **Βέλουρος** (*Sorghum halepense*), **Φτέρη** (*Pteridium aquilinum*): **Δόση:** 5 κ.εκ./10 τμ. (12,5 κ.εκ./1 λίτρο ψεκ. υγρού). **M.A.E/M.E:** 1-3/28. **Κύπερη** (*Cyperus* sp.): 1η εφαρμογή κατά την άνθηση με **Δόση:** 6 κ.εκ./10 τμ. (15 κ.εκ./1 λίτρο ψεκ. υγρού) και 2η εφαρμογή σε περίπου αναβλάστανσης με **Δόση:** 5 κ.εκ./10 τμ. (12,5 κ.εκ./1 λίτρο ψεκ. υγρού). **M.A.E/M.E:** 2.

• ΕΡΑΣΤΕΧΝΙΚΟ ΚΗΠΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΠΟΡΑ Ή ΦΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Ή ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ: α) Ετήσια ζιζάνια (Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα): Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης. **Δόση:** 2 κ.εκ./10 τμ. (5 κ.εκ./1 λίτρο ψεκ. υγρού). **Μολόκα** (*Malva* sp.), **Αντράκλα** (*Portulaca oleracea*), **Πολυκόμπι** (*Polygonum* spp.), **Τσουκνίδα** (*Urtica* sp.): **Δόση:** 6 κ.εκ./10 τμ. (15 κ.εκ./1 λίτρο ψεκ. υγρού). **M.A.E/M.E:** 1.

β) Πολυετή ζιζάνια (Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα): Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή. **Δόση:** 6 κ.εκ./10 τμ. (15 κ.εκ./1 λίτρο ψεκ. υγρού). **Βέλουρος** (*Sorghum halepense*), **Φτέρη** (*Pteridium aquilinum*): **Δόση:** 5 κ.εκ./10 τμ. (12,5 κ.εκ./1 λίτρο ψεκ. υγρού). **M.A.E/M.E:** 1.

• ΕΡΑΣΤΕΧΝΙΚΟ ΚΗΠΟΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΦΥΤΑ: α) Ετήσια ζιζάνια (Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα): Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης. Στην περίοδό στην οποία θα εφαρμοστεί να καλυφθεί το πολύ το 50% της έκτασης αυτής. **Δόση:** 2 κ.εκ./10 τμ. (5 κ.εκ./1 λίτρο ψεκ. υγρού). **Μολόκα** (*Malva* sp.), **Αντράκλα** (*Portulaca oleracea*), **Πολυκόμπι** (*Polygonum* spp.), **Τσουκνίδα** (*Urtica* sp.): **Δόση:** 6 κ.εκ./10 τμ. (15 κ.εκ./1 λίτρο ψεκ. υγρού). **M.A.E/M.E:** 1-3/21.

β) Πολυετή ζιζάνια (Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα): Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή. **Δόση:** 5-10 κ.εκ./10 τμ. (12,5-25 κ.εκ./1 λίτρο ψεκ. υγρού). **Αγριάδα** (*Cynodon dactylon*): **Δόση:** 10 κ.εκ./10 τμ. (25 κ.εκ./1 λίτρο ψεκ. υγρού). **Βέλουρος** (*Sorghum halepense*), **Φτέρη** (*Pteridium aquilinum*): **Δόση:** 5 κ.εκ./10 τμ. (12,5 κ.εκ./1 λίτρο ψεκ. υγρού). **Περικοκλάδα** (*Convolvulus arvensis*), **Κίρσιο** (*Cirsium arvense*): **Δόση:** 10 κ.εκ./10 τμ. (25 κ.εκ./1 λίτρο ψεκ. υγρού). **M.A.E/M.E:** 1-3/21. **Κύπερη** (*Cyperus* sp.): 1η εφαρμογή κατά την άνθηση με **Δόση:** 6 κ.εκ./10 τμ. (15 κ.εκ./1 λίτρο ψεκ. υγρού) και 2η εφαρμογή σε περίπου αναβλάστανση με **Δόση:** 5 κ.εκ./10 τμ. (12,5 κ.εκ./1 λίτρο ψεκ. υγρού). **M.A.E/M.E:** 2.

γ) Ξυλώδες θάμνοι, Βάτα (*Rubus* sp.): Όταν βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη. **Δόση:** 10 κ.εκ./10 τμ. (25 κ.εκ./1 λίτρο ψεκ. υγρού). **M.A.E/M.E:** 1-3/21.

Μέγιστη δόση ανά χρόνο για το σύνολο των εφαρμογών /12 μήνες: 432 γρ. glyphosate/στρέμμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Στις δενδρώδες καλλιέργειες και στα αμπέλια ψεκασμός των ζιζάνιων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλωμα, τριφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πλήγες κλαδέματος. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκεκριμένους οπωρώνες ή αμπελώνες από το τρίτο (3ο) έτος από την φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών. **2.** Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια *Malva* sp. (Μολόκες), *Urtica* sp. (Τσουκνίδες), *Polygonum* sp. (Πολυκόμπι), *Portulaca oleracea* (Αντράκλα), η δόση κυμαίνεται από 4-6 κ.εκ./10 τ.μ. ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης τους. **3.** Για την καταπολέμηση των ετήσιων ζιζάνιων απαιτούνται συνήθως μία με δύο (1-2) εφαρμογές (κειμώνα- άνοιξη) ή/και (καλοκαίρι-φθινόπωρο) ανάλογα με την εποχή εμφάνισης των ζιζάνιων και την καλλιέργεια, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης. **4.** Για την καταπολέμηση πολυετών ζιζάνιων απαιτείται συνήθως μία (1) εφαρμογή όταν το ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή. **5.** Επιβάλλεται οι κρίση προστατευτικών καλυμμάτων (καλυπτρών) γύρω από το μπεκ για την αποφυγή φυτοτοξικότητας στις καλλιέργειες. **6.** Για την ανχιάδα, η εφαρμογή να γίνεται όταν έχει ύψος 15-30 εκατοστά. **7.** Για τη φτέρη η εφαρμογή να γίνεται μετά το ξεδίπλωμα της κορυφής.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Μπλιά, Αχλαδιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά-Κιτριά, Γκρέιν φρουτ, Αμυγδαλιά, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Κερασιά, Ελιά, Αμπέλι: 7 ημέρες,

Εφαρμοστικό κήπου πριν τη σπορά ή φύτευση της όποιας καλλιέργειας ή μετά τη συγκομιδή των καλλιεργειών,
Εφαρμοστικό κήπου χωρίς κήπιαο καλλιέργεια ή άλλα επιθυμητά φυτά: -

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας.