



Magnum gel

Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο
δόλωμα σε μορφή gel για την
καταπολέμηση κατσαριδων.



Επαγγελματίες χρήστες

Κάτοχος της έγκρισης:



MYLVA S.A.
Via Augusta, 48
08006 Barcelona
Tel. +34 93 415 32 26
mylva@mylva.eu | www.mylva.eu



Υπεύθυνος διάθεσης:
ΔΑΦΝΗ Agrottrade Ltd.
Ιακωβίδου 50, 11143 - Αθήνα
Τηλ.: 2108104490,
Fax: 2108104491
email: info@dafnagro.gr
www.dafnagro.gr



MANUFACTURED EU

Περιεχόμενο:
4 x 40g e

Σύνθεση:

Imidacloprid (CAS: 138261-41-3) 2.15%
Βοηθητικές ουσίες: 97,78%

περιέχει πικραντικό παράγοντα
Αριθμός έγκρισης: TP118-0298
Εσωτερικοί χώροι. Κατοικημένα κτίρια και
επαγγελματικοί χώροι.

N.º UFI: 0800-E0C3-C00A-TQ6G

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει 1,2 Benzisothiazol-3(2H)-one and 2-ocryl-1,2-thiazol-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Μακριά από παιδιά. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Μαζέψτε τη χυμνή ποσότητα. Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης είναι μεταξύ 5°C και 45°C

Ο αριθμός παρτίδας και η ημερομηνία λήξης είναι τυπωμένα στη σύρριγγα.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Magnumgel



Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο δόλωμα σε μορφή gel για την καταπολέμηση κατσαριδών.

Εσωτερικοί χώροι. Κατοικημένα κτίρια και επαγγελματικοί χώροι. Εφαρμόστε με τη μορφή σταγόνας απευθείας από τη σύριγγα.

Τοποθετήστε το δόλωμα μόνο σε σχισμές και χαραμάδες, πίσω από έπιπλα και μηχανήματα. Το προϊόν δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε ανοιχτές επιφάνειες.

Μην κάνετε χρήση του προϊόντος σε χώρους όπου έχει γίνει εφαρμογή άλλων χημικών ή σε χώρους όπου πρόσφατα έχει χρησιμοποιηθεί κάποιο άλλο εντομοκτόνο. Μην το εφαρμόζετε επαφά σε ξύλο ή άλλες πορώδεις επιφάνειες. Αποφύγετε την επαφή

με τις επιφάνειες όπου έχει γίνει εφαρμογή. Μην τοποθετείτε τις σταγόνες σε σημεία εκτεθειμένα στον ήλιο ή ηγνές θερμότητας. Φορέστε προστατευτικά γάντια κατά την εφαρμογή. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Μην εφαρμόζετε σε σημεία που είναι προσβάσιμα σε παιδιά. Η εφαρμογή πρέπει να περιορίζεται σε σημεία όπου δεν έχουν πρόσβαση τα ζώα. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε επιφάνειες όπου παρασκευάζονται, ετοιμάζονται, καταναλώνονται ή αποθηκεύονται τροφές και τρόφιμα. Μπορεί να εφαρμοστεί στη βιομηχανία τροφίμων, απουσία τροφίμων, ή σε αποθηκευτικούς χώρους όπου τα προϊόντα διατηρούνται εντός συσκευασιών.

Πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι τα τρόφιμα, ο εξοπλισμός ή τα σκεύη που χρησιμοποιούνται σε χώρους που προηγουμένως έχει εφαρμοστεί το προϊόν, δεν περιέχουν υπολείμματα της δραστικής ουσίας. Χρησιμοποιείτε μόνο σε κρυπά σημεία, με δύσκολη πρόσβαση, και μακριά από το νερό. Υιοθετήστε μεθόδους ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων, όπως ο συνδυασμός χημικών & φυσικών μεθόδων και άλλων μέτρων διασφάλισης της δημόσιας υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες (κλιματολογικές συνθήκες, είδη-στόχοι, συνήθειες χρήσης κ.λπ.) Ελέγξτε την αποτελεσματικότητα του προϊόντος επί τόπου: εάν είναι απαραίτητο, πρέπει να διερευνηθεί η αιτία μειωμένης αποτελεσματικότητας ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει ανθεκτικότητα ή να εντοπιστεί πιθανή ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιοχές όπου υπάρχουν υπόνοιες ή αποδεδειγμένη ανθεκτικότητα. Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε με σαπούνι και άφθονο νερό χωρίς να τρίβετε. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε τους φακούς επαφής. Εφόσον απαιτείται να πάτε στο νοσοκομείο, δείξτε την ετικέτα ή τον περιέκτη του προϊόντος. Ποτέ μην αφήσετε τον ασθενή μόνο του.

Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Η σταθερότητα στην αποθήκευση του προϊόντος, εφόσον παραμείνει στην αρχική του συσκευασία, είναι τέσσερα (4) χρόνια υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Αποθηκεύστε στην αρχική συσκευασία. Αποθηκεύστε σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Μην το αποθηκεύσετε στο άμεσο ηλιακό φως.

Δόσεις: εξαρτάται από την ένταση της προσβολής και το είδος της κατσαρίδας. (1 σταγόνα = 0,04γρ).

Γερμανική κατσαρίδα (*Blattella germanica*): 0,12-0,16 γρ/m² (3-4 σταγόνες/m²).

Ανατολική κατσαρίδα (*Blatta orientalis*): 0,16-0,24γρ/m² (4-6 σταγόνες/m²).

Αμερικανική κατσαρίδα (*Periplaneta americana*): 0,16-0,24γρ/m² (4-6 σταγόνες/m²).

Συχνότητα εφαρμογής: μία (1) εφαρμογή ανά 4 εβδομάδες. Επαναλάβετε την εφαρμογή εφόσον η προσβολή παραμένει.

Επανάληψη εφαρμογής: τρεις (3) μήνες μετά από την εξαφάνιση της προσβολής.

Μακριά από παιδιά. Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τις προτεινόμενες δόσεις και τα μεσοδιαστήματα επεμβάσεων. Το προϊόν θα πρέπει να εφαρμόζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος καταναλώσεως του από ζώα και παιδιά. Μην απορρίψετε το προϊόν στο έδαφος, τα ύδατα ή στο σύστημα αποχέτευσης.

Συμβουλές για ιατρικά και νοσηλευτικά προσωπικά: Εφαρμόστε συμπληρωματική και υποστηρικτική θεραπεία. Σε περίπτωση που απαιτείται ιατρική συμβουλή, επικοινωνήστε το κέντρο δηλητηριάσεων έχοντας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Εκτακτα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος: Προφυλάξτε:

αποτρέψτε την είσοδο του προϊόντος στο περιβάλλον (επιφανειακά και υπόγεια ύδατα), αποχετεύσεις κ.λπ. με την κατασκευή προστατευτικών εμποδίων και κλείνοντας τους αγωγούς αποχέτευσης. Επικοινωνήστε με τις αρμόδιες αρχές για την αποτροπή διαρροών στο νερό και το αποχετευτικό σύστημα. Μέθοδοι με μέσα για τον περιορισμό διαρροής και τον καθαρισμό: απορροφήστε τη διαρροή με αδρανή υλικά (άμμος, καολίνη κλπ), συλλέξτε και τοποθετήστε σε κατάλληλα δοχεία ώστε να γίνει χειρισμός ως επικίνδυνο απόβλητο.

Το προϊόν περιέχει ένα πικραντικό παράγοντα που το καθιστά αποκρουστικό στον άνθρωπο και τα κατοικίδια.